

# 이젠이 캡슐

잇몸질환은 심각한 상태로 진행되기 이전에는 본인이 이상을 느끼지 못하므로 방치하기 쉽습니다. 치은염(잇몸염)은 잇몸에 염증이 생긴 상태로 양치질 할 때나 사과를 먹을 때 피가 나오며 점점 진행되면 잇몸이 붓고 색깔이 푸르게 변색되며 심해지면 출혈과 부종(부기), 발적(출혈되어 붉어짐), 통증 등이 나타나게 됩니다. 따라서 빠른 시기에 적절한 약물로 치료해주는 것이 좋습니다.

이젠이캡슐은 잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증을 수반하는 치은염(잇몸염) 및 치조농루를 효과적으로 완화시켜주는 역할을 합니다.

**【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(390mg) 중**

제피아스코르빈산(KPC) .....	156.0mg
염화리소짐(KPC) .....	30.0mg
초산토코페롤50%(KPC) .....	10.0mg
카르바조크롬(KPC) .....	2.0mg
첨가제(동물 유래) : 유당수화물	

**【성 상】** 옅은 주황색가루가 든 상, 하부 연청색의 경질 캡슐제

**【효능·효과】** 치은염, 치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증)의 완화

**【용법·용량】** 성인 1일 3회 1회 1캡슐을 식후에 복용한다.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

**【사용기간】** 제조일로부터 36개월

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오

- 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

2. 부작용

이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의하십시오.

※ 염화리소짐 함유제제(경구제-트로키제 포함), Lysozyme Chloride

- 1) 피부 : 스티븐스-존스 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성피과사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수증 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한, 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

2) 유아에서 이 약에 함유된 염화리소짐을 처음으로 복용했을 때, 속(아나필락시)이 나타났다는 보고가 있으므로 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다. (3세 미만의 용법이 있는 내용액제, 시럽제에 한함)

### 3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과 의사)와 상의하십시오.

### 4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

※ 유당(무수유당 및 유당수화물 등) 함유제제

다음 환자에는 투여하지 말 것.

: 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

※ 개정일 : 2009년 10월 8일

개정일 2009년 10월 8일 이후 변경된 내용은 이지드렉(<http://www.ezdrug.kfda.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 첨가제(타르색소) : 적색 3호, 청색 1호

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부 문서를 의약품과 함께 보관 하십시오.
- 소비자상담실 및 홈페이지 : 02-2619-2900 <http://www.kyungjinpharm.co.kr>

판매원



종근당

계업회사 경보제약

제조원

생약전문메이커  
경진제약(주)  
경기도 시흥시 과림동 1-8