

일반의약품
분류번호 322
무기질제제



KGMP 적격업체제품

[원료약품 및 분량] 1정 중

유효성분 : 폴리말토오스수산화제이철착염(KP) 125mg(철로서 35mg)
판토텐산칼슘(KP) 100mg
폴산(KP) 0.5mg
기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 저치한도히드록시프로필셀룰로오스, 포비돈, 클로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 오파드라이벨간색(200F650003)

[성 상] 적갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회 1정 복용

[사용상의 주의사항]

- 경고
철 함유제제는 6세이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다.
만약 어린이가 사고로 과량 복용 하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
3) 혈액소중 (철 대사 이상으로 철이 긴장, 헤모지자)에 침착하는 질환, 헤모시데 린침 착증, 비철결핍성 빈혈
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국헌성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
3) 심장·순환기계기능 장애 환자
4) 신장에 환자(신장장애)
5) 저단백혈증 환자
- 이상반응
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
: 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수
2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사 와 상의한다.
- 상호작용
1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다. : 인산 염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 뒹 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(우경을 꼭달아)하여 보관한다.
3) 오용(잘못사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위] 30정(10정 PTP X 3)

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조일로부터 36개월

- ※ 본 제품은 KGMP(우수약품 제조관리 기준)에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과 되었거나, 변질, 변태, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://medrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인 할 수 있습니다. 사용(유효)기간이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 소비자 상담실 : 080-777-6285 / www.sspfarm.co.kr

첨부문서 최종개정연월일 : 2019년 02월 12일

SAMSUNG PHARM
삼성제약주 Since 1929
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 35