

간세포보호를 드는 밀크시슬엑스 350mg 함유

레가탄 포르테
(연질캡슐)

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

밀크시슬엑스(실리마린으로서 196.0 mg)(KHP) 350.0mg
타르색소 : 청색4호 적색40호(KPTaCS)

[성상] 흰색의 유상 내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과] 다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법·용량] 1일 1회, 1회 1캡슐

[사용상 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부 문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검 할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼란되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀접하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에에서 끼어내 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 120C

* 시용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 (OO. DD. MM)로 표기되어 있으며 OO년 DD월 MM일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질변색되었거나 손상된 의약품을 구입하였을때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서에 개정일자 이후 변경된 내용은 당시 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약 소비자 상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이나 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이지드릭) 보고마당 안전성 정보 의약품유해사례보고에 알려주시기 바랍니다.
- 제조자 : 한국프리임제약(주) / 전북 원주군 봉동을 원주산단9로 100
- 제조의뢰자 : 영일제약(주) / 충북 진천군 진천읍 문화1길 6-1
- 판매자 : 동화의약품(주) / 본사 : 서울특별시 종로 후암로 98, 19층 / 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.