

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오.

생약성분 간질한 보조치료제

분류번호 : 391 일반의약품

맥스헤파 연질캡슐

밀크시슬엑스 350 mg

MAXHEPA soft capsules**【원료약품의 분량】** 1 캡슐 중

유효성분: 밀크시슬엑스(신리마린으로서 196 mg)(생규) 350 mg

첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호

첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 돼지 - 가죽)

기타첨가제: 농갈리세린, 레시틴, 산화티탄, 소르비톨(비경정성), 아자경화유, 에틸바닐린, 풍기름,

폴리소르베이트80, 황납

【성 상】 황갈색의 유상(기름상태) 내용물을 함유한 압적색(검붉은 색)의 장방형 연질캡슐**【효능·효과】** 다음 질환의 보조 치료: 독성 간질환, 만성 간염, 간경변**【용법·용량】** 1일 1회, 1회 1캡슐 복용**【사용상의 주의사항】**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 심한 담도(쓸개산) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. (상담이 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.)

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조정합니다. 환자가 다른 경우를 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 뒀 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관**【포장단위】** 60캡슐(10캡슐/TPP X 6)**【문의전화】** 본사 : (02)9201-9300, 소비자상담실 : 080-023-1897 (수신자 요금부담)**【제조외지】** 동화약품(주), 본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167**【제조지】** 코스맥스바이오(주), 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

본 의약품은 KGMP 품질관리를 위한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품 안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 첨부문서 작성일자(2018년 4월 12일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.**동화약품**

SINCE 1947