

# 1회요법 구충제 활알벤다졸 (정)

일반의약품 / 분류번호 : 06420

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

### [원료약품 및 그 분량] 1정 중

알벤다졸(USP) .....	400mg
적색 3호(KPTaCS) .....	적량

유당수화물(KP)기원동물 : 소, 사용부위 : 우유

**[성 상]** 타원형의 분홍색 필름코팅정

**[효능 · 효과]** 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충, 분선충의 감염 및 이들 혼합감염의 치료

**[용법 · 용량]**

1. 성인 및 2세이상의 유 · 소아

- 회충, 요충, 십이지장충, 편충, 아메리카 구충 : 400mg을 1회 복용한다. 2세이상의 유 · 소아의 요충증은, 200mg을 1회 복용하고 7일 후 200mg을 반복 복용할 수 있다.
- 분선충 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다.
- 편충의 증증 혼합 감염시 : 1일 1회 400mg을 3일간 복용한다.  
 ※ 씹거나 소량의 물로 복용할 수 있으며 식사를 중단하거나 하제(설사약)를 쓰는 등의 특별한 과정은 필요없다.  
 ※ 치료 3주 후 검사를 하여 치료되지 않았으면 경우에 따라 2차 복용을 실시할 수 있다.

### [사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자 2) 임부 3) 2세 미만의 영아 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 테오필린 : 테오필린의 대사를 억제할 수 있다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사 및 약사와 상의할 것. 이 약이 모유로 이행되는지에 관해서는 알려진 바 없으나, 이 약 복용 시에는 수유를 중단하는 것이 좋다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상심 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 다형홍반이 나타날 경우 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다. 2) 구역, 구토, 속쓰림, 설사, 상복부 또는 복부 통증 등의 위장관 장애 또는 두통 및 어지러움이 나타날 수 있다. 3) 두드레 발열, 발진, 전신 발적(전신에 충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기 등이 나타났다는 보고가 있다. 4) 가역적인 탈모증이 나타날 수 있다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 이 약 사용 전에는 반드시 임신 중이 아님을 확인한 후에 사용할 것. 임신초기 동안에 이 약의 투여를 피하기 위해서 가임연령의 여성은 생리 첫 주 동안 또는 임신 테스트에서 음성인 나타난 후에 치료를 시작할 것 2) 임상검사치에의 영향 : 때때로 가역적인 백혈구 수의 감소를 유발할 수 있고, 과도한 처방시 범혈구(전체 혈구) 감소증 및 간효소치 이상을 유발 할 수 있다. 3) 프라지관텔이 알벤다졸 활성대사체의 혈장농도를 증가시킨다는 보고가 있다. 4) 과량투여 했을 경우 대증요법(증상별로 치료하는 방법(위세척) 및 일반적인 지지요법을 사용한다.
- 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선의 피하여 건생한(건조하고 시원한) 곳에 실온 보관할 것. 3) 오용(절대 사용)및 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

**[저 장 방 법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 **[사 용 기 간]** 제조일로부터 36개월 **[포 장 단 위]** 2정

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) - 「정보마당」 - 「의약품등 정보」를 참조하시거나 02-564-2772로 문의하여 주십시오.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 작성일 : 2010년 2월 8일