

어깨결림 치료제-

스카폴라 정

[제품명] 스카폴라정

[성분함량] 이 약 1정(350mg) 중

- 클로르족사존(KP)	150.0mg
- 에텐자미드(KP)	150.0mg
- 카페인수화물(KP)	25.0mg (카페인으로서 22.87mg)

[성상] 이 약은 흰색의 원형의 필름코팅정입니다.

[효능·효과] 신경통, 요(허리)통, 어깨결림

[용법·용량] 성인 1회 1-2정 1일 2회 동통(통증) 또는 발작 시에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 어린이 (14세 이하)
 - 간장, 신장, 감광성질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
 - 고령자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
 - 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 다음 약물과는 동시에 복용하지 마십시오.
 - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
 - 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도·감독 하에 복용시키십시오.
- 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.
 - 복용하는 동안 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 장기 연용(계속 복용)하지 마십시오.
- 보관 및 취급상의 주의
 - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 10정

- 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[최신정보 확인 방법]

이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 홈페이지(www.donga.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
 ※ 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족실), 02-920-8279(제품문의)

작성년월일 : 2012. 01.

SCP-2A001