



호이스타 정

(카모스타트메실산염)

소화기용제

[개 요]

호이스타 혹은 camostat mesilate는 경구용 단백분해효소 억제제로 trypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, elastase 등에 대해 강력한 저해 작용을 가지며, 만성췌장염 환자분에서 혈청 아밀라제 농도 향상뿐만 아니라 염증 증상과 통증 완화에도 효과를 보이며, 식도에서 역류된 위액 중 트립신을 억제하여 수술 후 역류성식도염 개선에 효과를 보입니다

[원료약품 및 그 분량]

카모스타트메실산염(JP) 100mg

[성 상]

흰색 - 황백색의 원형필름코팅 정제

[효능·효과]

- 단백분해 효소(트립신, 칼리크레인, 플라스민 등)의 일탈에 의한 만성췌장염의 급성증상의 완화
- 위절제 수술 후 역류성 식도염

[용법·용량]

- 만성췌장염
성인 : 카모스타트메실산염으로서 1회 200mg을 1일 3회 경구투여 합니다.
- 위절제 수술 후 역류성 식도염
성인 : 이 약으로서 1회 100mg을 1일 3회 투여합니다.
증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상 주의사항]

- 다음 환자분에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 위액흡인, 절식, 절음 등의 식사제한을 필요로 하는 중증 환자분
 - 2) 위액의 역류에 의한 수술 후 역류성 식도염 환자분(이 약의 효과를 기대할 수 없습니다.)
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자분에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음의 환자분에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성분
 - 2) 소아분
 - 3) 고령자분
- 이상반응
 - 1) 할색계 호산구 증가, 드물게 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타내면 감람 또는 투여를 중지합니다.
 - 2) 과민반응 : 때때로 발진, 가려움 등의 과민증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 3) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 구역, 구갈, 복통, 복부불쾌감, 복부팽만감, 설사, 드물게 구토, 가슴쓰림, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 간장 : 때때로 AST, ALT 수치의 상승, 간기능 이상이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 신장 : 드물게 BUN, 크레아티닌 상승이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 기타 : 때때로 부종, 드물게 저혈당, 고칼륨혈증이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의

이 약으로 증상의 개선이 보이지 않는 경우에는 장기간 투여하지 않습니다.

5. 임부에 대한 투여

인체 투여량의 40배(400mg/Kg/1일) 이상을 투여한 동물실험에서 태자 체중의 억제가 보고되었으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성분에게는 대량투여를 피합니다.

6. 소아에 대한 투여

저체중 출생아, 신생아, 유아, 또는 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.
(사용경험이 없습니다).

7. 고령자에 대한 투여

고령자에 이 약을 투여하면 성인에 비해 이상반응이 더 심하게 나타날 수 있습니다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

배합주의: 올메살탄메독소밀 제제와 병용 처방되어 동일 약포지에 담겨 조제할 때, 이 약의 변색이 일어날 수 있으므로, 다른 약포지에 담겨 조제하도록 합니다.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

※본의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9) 에서 확인할 수 있습니다.

 **(주)대웅제약**
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일: 2012. 04. 13
최종 개정 연월일: 2012. 04. 13