


고함량 신경비타민제 임펙타워 정



분류번호 : 316

【성분·함량】1정(816.4mg) 중

- 유효성분:
 - 피리독신염산염(KP)..... 50mg
 - d-비오틴(USP)..... 0.25mg
 - 시아노코발라민(KP)..... 0.05mg
 - 토코페롤아세테이트2배산(BP)(비타민E로서 10 IU) 20mg
 - 폴산(KP) 0.2mg
 - 벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 36.15mg)..... 50mg
 - 니코틴산아미드(KP)..... 50mg
 - 판토텐산칼슘(KP) 50mg
 - 산화아연(KP)(아연으로서 15mg) 18.7mg
 - 아스코르브산과립(별규)(아스코르브산으로서 30mg) 31.25mg
 - 우르소데옥시콜산(KP) 15mg
 - 이노시톨(KP)..... 50mg
 - 리보플라빈(KP)..... 50mg
 - 콜린타르타르산염(DAB) 50mg
 - 셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 25 μ g)..... 46.3mg
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 오파드라이|갈색(85F465001), 카르나우바남

【성 상】 갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음의 경우 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓은 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 비타민 B₁(벤포티아민)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨걸림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 비타민 B₂(리보플라빈), 비타민 B₆(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

【용법·용량】만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1일 1회, 2정씩 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장(콩팥)장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 위장관(창자)장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기), 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(요산과다증)(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
 - 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】제조일로부터 36개월

【포장단위】60정/병

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 본 제품은 우수약품제조 및 품질관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중에 변질 또는 파손되거나 사용기한이 경과된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조의뢰·판매자
 **명문제약주식회사**
 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26
www.mmpharm.co.kr

제조사
 **Arlico**
 알리코제약 | 주
 충북 진천군 광혜원면 용소2길 21
<http://www.arlico.co.kr>

(설명서작성년월일 : 12. 07. 01)
 (설명서개정년월일 : 18. 05. 17)
 (M06)