

광범위 경구용 항진균제

# 아이트라정

(이트라코나졸고체분산체)

전문 의약품

100정

제조사 : 제이더블유중의약품(주) 충청남도

의약품정보

이이드릭(<http://ozdrug.klda.go.kr>)

... 「정보마당」, 「의약품 동 정보, 참조

제조번호/사용기한 :

**[원료약품 및 그 분량]** 1정 중

이트라코나졸고체분산체(별규) ... 253mg

(이트라코나졸로서 100밀리그램)

**[성상]** 흰색 또는 미황색을 띤 원형 필름코팅정

**[효능·효과/용법·용량/주의사항]**

첨부문서(라벨뒷면) 참조

**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

제조의회사  **근화제약(주) 충청남도**

40mm

20mm

여기서부터 여세요

100mm

광범위 경구용 항진균제

# 아이트라정

(이트라코나졸고체분산체)

## ITRA Tab (Itraconazol Solid Dispersions)

전문 의약품

분류번호 629

**[원료약품 및 그 분량]** 1정 중

이트라코나졸고체분산체(별규) ... 253mg

(이트라코나졸로서 100밀리그램)

253mg

1.01

93mm

**[성상]** 흰색 또는 미황색을 띤 원형 필름코팅정

**[효능·효과]**

1. 칸디다성 질염

2. 어루러기

3. 피부상감균에 의한 체부백선, 고부백선(완선), 수부백선, 족부백선

4. 구강칸디다증

5. 진균성각막염

6. 손·발톱진균증

7. 다음과 같은 전신진균감염증 : 아스페르길루스증, 칸디다증, 크립토코쿠스증(크립토코쿠스 수막염 포함), 파라콕시디오이드미시스증

**[용법·용량]**

이 약은 흡수율을 높이기 위하여 식사 직후에 투여하는 것이 바람직하다.

02

1. 단기투여

이 약은 투여 중지 후에도 피부조직에서 지속적인 치료 작용을 나타낸다. 따라서 최종적인 임상적 및 진균학적 치료효과는 소정의 치료를 마친 후 2~4주 후에 판정하는 것이 바람직하다.

1) 칸디다성 질염 : 이트라코나졸로서 1회 200mg을 1일 2회(아침, 저녁) 1일간 투여하거나 또는 1일 1회 200mg을 3일간 투여한다.

2) 어루러기 : 1일 1회 200mg을 7일간 투여한다.

3) 체부백선, 고부백선(완선) : 1일 1회 100mg을 15일간 투여한다.

4) 수부백선(지간형), 족부백선(지간형) : 1일 1회 100mg을 15일간 투여한다.

5) 수부백선(손바닥), 족부백선(발바닥) : 1일 1회 100mg을 30일간 투여 또는 1회 200mg을 1일 2회 7일간 투여한다.

6) 구강칸디다증 : 1일 1회 100mg을 15일간 투여한다.

7) 진균성각막염 : 1일 1회 200mg을 21일간 투여한다.

2. 손·발톱진균증

1) 주기요법 : 1회 200mg씩 1일 2회 1주간 투여한 후 3주간을 휴약하는 방법을 1주기로 하여, 손

1.03

뼈에만 감염된 경우에는 2주기까지, 발톱에 감염된 경우에는 3주기까지 부여한다.

손 · 발톱진균증 부위	1주	2주 3주 4주	5주	6주 7주 8주	9주
발톱(손톱감염이 동반되거나 동반되지 않은 경우)	투약	휴약	투약	휴약	투약
손톱	투약	휴약	투약		

또는

2) 연속요법

1일 1회 200mg씩 3개월간 부여한다. 부여종료 후에도 손톱은 3개월 동안, 발톱은 6개월 동안 치료효과가 지속된다.

3. 전신진균감염증

호중구감소증, AIDS, 장기이식 환자와 같이 면역기능이 저하된 환자의 경우에는 이 약의 경우 생체 이용률이 저하될 수 있으므로 필요한 경우 용량을 2배로 증량하여 투여한다.

0.4

적응증	용량	평균치료기간	비고
아스페르길루스증	200mg 1일 1회	2~5개월	침습성 또는 파종성 질환의 경우
칸디다증	100~200mg 1일 1회	3주~7개월	에는 1회 200mg 1일 2회로 증량
크립토크쿠스수막염	200mg 1일 2회	2개월~1년	유지요법 : 200mg 1일 1회
파라콕시디오이드미시스증	100mg 1일 1회	6개월	

[사용상의 주의사항]

1. 경고

울혈성심부전과 같은 심실기능 저하 환자 또는 울혈성 심부전 병력자에게는 손 · 발톱진균증 치료를 위해 이 약을 투여하지 않도록 한다. 투여 중 울혈성 심부전의 증상 및 징후 발생시 투여를 중단한다. 이트라코나졸을 건강한 자원 피험자와 개에게 정맥투여 시 심근수축력 감소가 관찰되었다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

0.5

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 울혈성 심부전과 같은 심실기능 저하 환자 또는 울혈성 심부전 병력 환자에 대한 손 · 발톱진균증 치료목적의 투여

3) 다음의 약물을 투여 중인 환자 :

(1) CYP3A4에 의해 대사되며 QT 간격을 연장시킬 수 있는 약물 : 아스테미졸, 베프리딜, 시사프리드, 도페틸리드, 레바세틸메타롤(레보메타딜), 미졸라스틴, 피모자이드, 퀴니딘, 쉐틴돌, 테르페나딘과 이트라코나졸을 병용투여시 이들 약물의 혈장농도를 상승시켜 결과적으로 QT 연장과 Torsades de pointes를 드물게 야기 할 수 있다.

(2) CYP3A4에 의해 대사되는 HMG-CoA reductase 억제제 : 심바스타틴, 로바스타틴, 아토르바스타틴

(3) 트리아졸람, 경구용 미다졸람, 알프라졸람

(4) 맥각알칼로이드 : 디히드로에르고타민, 에르고메트린(에르고노빈), 에르고타민, 메칠에르고메트린(메칠에르고노빈)

(5) 니슌디핀

0.6

(6) 바데나필(75세 이상 남성)

(7) 할로판트린

4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자(경우)에는 신중히 투여할 것

1) 간장애 환자 및 다른 약물로 인한 간독성을 경험한 환자 : 이 약은 주로 간에서 대사되므로 치료의 유효성이 간손상의 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하며, 이러한 경우에는 간기능검사를 모니터링한다.

2) 울혈성 심부전과 같은 심실기능 저하 환자 또는 울혈성 심부전 병력 환자에 대한 손 · 발톱진균증 치료목적 이외의 투여

0.7

- 3) 신장에 환자(생체이물)가 검출되면 소염진통제 복용을 고지한다.)
- 4) 이 약으로 인한 신경병증이 발생한 환자
- 5) 호흡기감염증, AIDS 또는 장기 이식 환자와 같은 면역기능억제 환자(경구생체이물)가 검출될 수 있으므로 용량 조절을 고지한다.)
- 6) 생명위협하는 전신진균감염 환자에 대한 초기 치료목적의 부여
- 7) 다른 마취제 약물에 대한 과민반응의 병력이 있는 환자
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 황달증 등 시금치 이상 환자 또는 지질성 유체불균형을 부여해야 하는 환자

**4. 이상반응**

- 1) 임상시험 중 보고된 이상반응 : 이 약에 대한 피부진균증과 손·발톱진균증 치료에 대한 위약 대조 임상시험에서 보고된 이상반응 중 이 약과의 인과관계에 상관없이 이 약 치료 환자에서 1% 이상의 빈도로 보고된 모든 이상 반응은 다음 표와 같다. 이 약으로 치료한 환자의 약 28% 의 위약을 투여한 환자의 약 23%가 적어도 한 가지 이상의 이상반응을 경험하였는데, 임상 시험에서 가장 빈번하게 보고된 것은 위장관계 이상반응이었다.

08.1

**<이 약 치료 환자에서 1% 이상의 빈도로 보고된 이상 반응>**

	이트라코나졸 투여군(%) N=929	위약 투여(%) N=661
전신	5.8	5.9
상해	2.9	3.0
중추 및 말초신경계 장애	5.7	6.4
두통	4.0	5.0
위장관계 장애	9.0	6.5
구역	2.4	2.6
설사	2.3	2.0
백분	1.8	1.4
소화불량	1.7	0.9

10.9

복부명안감	1.3	0.5
간 및 담도계 장애	2.2	1.1
간기능이상	1.0	0.3
호흡기계 장애	6.0	5.7
비염	2.0	2.1
상기도 감염	1.8	1.1
부비농염	1.7	1.7
피부 및 부속기계 장애	5.1	2.1
발진	2.5	0.6

- 2) 혈액계 : 백혈구 증가, 때때로 호산구 증가, 백혈구 감소, 혈소판 감소, 드물게 호중구 감소, 빈혈이 나타날 수 있다.
- 3) 과민반응 : 드물게 맥관부종, 매우 드물게 혈청병, 이나뿔딱시 속, 아나필락시스양 반응이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

10.10

- 4) 중추 및 말초신경계 : 드물게 말초신경병증, 지각이상, 지각완화가 나타날 수 있다. 이 약으로 인한 신경병증이 나타나면 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 5) 눈 : 드물게 시야 흐림, 복시를 포함하는 시각장애가 나타날 수 있다.
- 6) 귀 : 드물게 이명, 일시적 또는 영구적 청력소실이 나타날 수 있다.
- 7) 순환기계 : 고혈압, 심상심기외수축, 심방차단, 심계항진, 매우 드물게 울혈성 심부전이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 8) 호흡기계 : 드물게 폐부종이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 9) 소화기계 : 때때로 복통, 구역, 변비, 설사, 구토, 소화불량, 점막염증, 드물게 트림, 하역, 구내염, 복부요배부종증, 미각장애가 나타날 수 있다.
- 10) 간장 : 때때로 AST/ALT, LDH,  $\gamma$ -GTP, ALP의 상승, 드물게 황달, 형질 용단백, 총 빌리루빈, LAP의 상승, 중대한 간독성(치명적인 급성 간부전 포함), 간염이 나타날 수 있으므로 식욕부진, 구역, 구토, 권태감, 황달, 복통, 갈색뇨와 같은 증상이 나타나는 것에 주의하면서 정기적으로 간기능검사를 실시하여 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

11

- 11) 피부 : 드물게 피부적막양홍후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리엘레후군) 가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 다형홍반, 때때로 발진, 가려움, 드물게 홍반성발진, 탈모, 두드러기, 광과민반응, 박탈성피부염, 백혈구파괴성혈관염이 나타날 수 있다.
- 12) 근골격계 : 매우 드물게 근육통, 관절염이 나타날 수 있다.
- 13) 신장 및 비뇨기계 : 때때로 BUN 상승, 드물게 요단백과 요당의 양성반응, 드물게 빈뇨증, 요삼금이 나타날 수 있다.
- 14) 생식기 : 드물게 발경장애, 발기기능장애가 나타날 수 있다.
- 15) 정신신경계 : 성욕감소, 졸음, 때때로 권태감, 드물게 어깨결림, 불면, 어지러움, 두통이 나타날 수 있다.
- 16) 기타 : 홍종, 때때로 부종, 혈청트리글리세리드치 상승, 드물게 발열, 화끈감, 혈청요소산치, 혈청칼륨치의 상승, 저칼륨혈증이 나타날 수 있다.

#### 5. 일반적 주의

- 1) 건강한 지원자를 대상으로 이 약 정맥주사제를 투여하는 시험에서, 죄심심박출률의 일시적

12

인 부등상저하가 관찰되었으며, 이것은 다음 주사제 투여 전에 회복되었다. 이러한 결과와 경구제의 관련성에 대해서는 알려지지 않았다.

이 약은 심근수축력 감소를 나타내며, 유허성심부전과의 관련성도 보고되었으므로, 이 약의 유익성이 위험성을 상회할 경우를 제외하고는 유허성 심부전 환자 또는 병력자에게는 이 약을 투여하지 않는다. 1일 총 투여량이 400mg일 때, 이보다 적게 투여하는 경우보다 더 빈번한 심부전이 보고되므로, 심부전의 위험성은 이 약의 1일 총 투여량에 따라 더 증가할 수도 있다. 각 환자에 있어서의 유익성/위험성에 대한 평가는 질환의 심각성, 용법(1일 총 투여량 등), 그 환자의 유허성심부전에 대한 위험요인을 고려해서 평가해야 한다. 이러한 위험요인에는 허혈성 및 판막질환과 같은 심질환, 만성폐쇄성폐질환과 같은 심각한 폐질환, 심부전 및 다른 부등성 질환이 포함된다. 위험요인이 있는 환자는 유허성심부전의 징후 및 증상에 대해 주시시키고, 치료기간동안 주의깊게 관찰해야 하며, 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 이 약 투여시 매우 드물게 치명적인 급성 간부전을 포함하는 중증 간독성이 보고되었다. 간독성이 나타난 환자들은 대부분 기존에 간질환이 있었던 환자들이었고, 전신 질환의 치료목적이었으며, 심각한 다른 질환을 동반하거나 다른 간독성 약물을 복용하고 있었다. 일부는 간질환

13

에 대한 뚜렷한 위험요인이 없었다. 간독성은 치료시작 1개월(주일) 이내에 나타날 것 포함)이 내에 나타날 경우도 있다. 그러므로 이 약을 투여할 때에는 정기적인 간기능검사를 실시해야 한다.

이 약은 주로 간에서 대사되므로 간경변 환자는 이 약의 배설 반감기가 다소 연장된다. 경구 생체이용률이 다소 감소하므로 필요시 용량조절을 고려한다.

3) 스포로트렉스중, 플라스토미세스중, 히스토플라스마중 또는 크립토톡스스중(수막염 포함)과 같은 전신성 진균감염증에 대한 치료를 받은 후 재발의 위험이 있는 것으로 판단되는 AIDS 환자는 유지요법목적의 투여를 고려해야 한다.

4) 호중구감소증, AIDS 또는 장기 이식 환자나 같은 면역기능억제 환자들에서 이 약의 항정상태의 농도는 일반적으로 낮은 수준이므로 1일 400mg의 고용량을 사용하는 것이 적절하다. 특히 약물 흡수율이 변하는 특정한 상황(예 : 금식, 이식편대 숙주반응, 설사, 점액증) 및 치료시폐가 의심되는 경우에는 초기 치료시 혈중 약물농도를 모니터링 해야 한다.

5) 이트라코나졸 투여 환자에게서 일시적 또는 영구적 청력 소실이 보고되었다. 이를 보고 중 몇몇은 병용금기인 퀴니딘을 병용투여한 경우를 포함하였다(6. 상호작용항 참조). 청력 소실은

14

일반적으로 투여가 중단되면 해소되거나 일부 환자에서는 지속될 수 있다.

- 6) 이 약은 운전 및 기계조작에 영향을 미치지 않는다.
- 7) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

#### 6. 상호작용

1) 위산도의 저하로 이 약의 흡수가 감소될 수 있으므로, 수산화알루미늄 등의 제산제는 적어도 이 약 투여 1시간 전 또는 2시간 후에 투여하도록 한다. 그리고 일부 에이즈 환자처럼 무염산증을 가지고 있는 환자 또는 H<sub>2</sub>길항제, 프로톤펌프 저해제와 같은 위산분비억제제를 투여받고 있는 환자는 이 약을 콜라와 함께 복용하는 것이 바람직하다.

2) 이 약은 CYP3A에 의해 대사되는 약물의 대사에 영향을 미칠 수 있는데, 이 약과 상호작용이 알려진 약물은 다음과 같다.

- (1) 이 약 투여시 병용 금기인 약물

15

- ① 아스테미졸, 베프리딜, 시사프리드, 도페틸리드, 레바세틸메타돌(레보메타딜), 미졸라스틴, 피모짓, 퀴니딘, 써탄돌, 테르페나딘과 이 약을 병용투여시 이들 약물의 혈장농도를 상승시켜 QT 간격 연장과 Torsades de pointes, 심실빈맥, 심정지, 급사와 같은 중증이고 치명적인 이상반응을 일으킬 수 있다.
- ② 이 약과 CYP3A4에 의해 대사되는 HMG-CoA reductase 억제제(심바스타틴, 로바스타틴, 아토르바스타틴 등)의 병용시 이들 약물의 혈중농도가 상승되어 횡문근융해증이 발생할 수 있다.
- ③ 디히드로에르고타민, 에르고메트린(에르고노빈), 에르고타민, 메칠에르고메트린(메칠 에르고노빈)과 같이 CYP3A4에 의해 대사되는 맥각알칼로이드
- ④ 벤조디아제핀류(트리아졸람, 경구용 미다졸람, 알프라졸람): 벤조디아제핀류의 혈장농도를 증가시킬 수 있다. 혈장 농도의 증가는 수면 및 진정작용을 증강 및 연장시킬 수 있다.
- ⑤ 니솔디핀: 니솔디핀의 혈장 농도가 상승될 수 있다.
- ⑥ 바데나필(75세 이상 남성): 저혈압의 위험과 함께 바데나필의 혈장농도가 증가하므로 병용투여하지 않으며 75세 미만의 남성은 신중히 투여한다.

16

- ① 할로판트린: 할로판트린은 높은 혈장 농도에서 QT 간격을 연장시킬 가능성이 있다.
- (2) 이 약에 의해 혈장농도가 증가하여 용량감량을 고려해야 하는 약물: 항부정맥제(디곡신, 디소피라미드), 항전간제(카르바마제핀), 항결핵제(리파부틴), 항암제(부실판, 도세탁셀, 빈카알칼로이드, 트리메트렉세이트), 벤조디아제핀계(디아제팜, 브로티졸람), 칼슘채널차단제(디히드로피리딘계, 베라파민), 면역억제제(사이클로스포린, 타크롤리무스, 시롤리무스), 경구혈당강화제, Protease 억제제(인디나비르, 리토나비어, 사퀴나비르), 레바세틸메타돌, 알펜타닐, 부스피론, 메틸프레드니솔론, 부데소니드, 텍사메타손, 플루티카손, 트리메트렉세이트, 와파린, 글로스타졸, 일레트립탄, 실로스타졸, 에비스타틴, 펜타닐, 록세세틴, 레파글리니드
- (3) 이 약의 혈장농도를 감소시켜서 병용투여시 이 약의 투여량을 조절하거나 투여간격을 조절해야 하는 약물: 항전간제(카르바마제핀, 페노바르비탈, 페니토인), 항결핵제(이소니아지드, 리파부틴, 리팜핀), 산분비억제/중화제(제산제, H<sub>2</sub>결합제, 프로톤펌프 저해제), 네비라핀, 디다노신
- (4) 이 약의 혈장농도를 증가시켜서 병용투여시 이 약의 투여량을 감소시키는 등 주의해야 하는

17

약물: 마크로라이드계 항균제(클래리스로마이신, 에리스로마이신), Protease 억제제(인디나비르, 리토나비어)

- 3) 이 약은 주로 CYP3A4 효소를 통해 대사되므로 강력한 CYP3A4 효소유도체인 리팜핀, 리파부틴, 페니토인과의 상호작용 연구에서 이 약과 허드록시에트라코나졸의 생체이용률이 치료효과가 크게 떨어질 정도로 저하되었으므로, 이들 약과의 병용투여는 권장하지 않는다. 그리고 다른 효소유도체인 카르바마제핀, 페노바르비탈, 이소니아지드에 대한 공식적인 연구 자료는 없지만 비슷한 영향이 예상된다.
- 4) 이 약과 지도부딘(AZT) 및 플루바스타틴과의 어떤 상호작용도 보고된 바 없다.
- 5) 이 약은 에치널, 에스트라디올 및 노르에치스테론의 대사를 유도하지 않는다.
- 6) 단백질합에 대한 영향: *In vitro* 연구에서 이 약은 이미프라민, 프로프라놀롤, 디아제팜, 시메티딘, 인도메타신, 플루타마이드, 설파메타진과 혈장단백결합에 대한 상호작용을 일으키지 않았다.
- 7) 이 약과 실데나필의 병용투여시 실데나필의 C<sub>max</sub>, AUC가 증가하는 것으로 보고되었다.

#### 7. 임부 및 수유부에 대한 투여

18

- 1) 동물실험에서 이 약의 고용량 투여시(랫트: 1일 40mg/kg 이상, 마우스: 1일 80mg/kg 이상) 태자기형 발생률의 증가가 나타났으며 배자독성이 유발되었다.
  - 2) 임신 중 이 약의 사용에 대해서는 제한된 정보만 있다. 시판 후 사용조사에서 염색체이상, 복합 기형, 골격, 비뇨생식기, 심혈관계, 눈의 기형과 같은 선천성기형의 사례가 보고되었으나, 이 약과의 상관관계는 확립되지 않았다. 역학조사에서 임신 초기 3개월(1st trimester)에 이 약에 노출된 경우(대부분 칸디다성 질염으로 단기간 투여함), 다른 기형유발물질에 노출되지 않은 대조군과 비교 시 기형의 위험이 증가되지는 않았다.
  - 3) 이 약은 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않으며, 임신할 가능성이 있는 여성에게 이 약을 투여할 시 투여종료 후 다음 생리기간까지 적당한 방법으로 피임한다.
  - 4) 이 약은 모유 중으로 이행되므로 이 약 투여 중에는 수유를 중단한다.
8. 소아에 대한 투여
- 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

19

9. 과량투여시의 처치

과량투여시에는 복용 1시간 이내에는 위세척을 하는 등 적절한 처치를 하여 필요할 경우 활성탄, 중탄소나트륨 투여 등의 대증요법을 실시한다. 이 약은 혈액투석에 의하여 제거되지 않으며 특별한 해독제는 없다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관함
- 2) 의약품용 원래 봉기에서 꺼내어 다른 봉기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 봉기에 보관한다.

【포장단위】 28정, 100정

【저장방법 및 사용기간】

- 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- 사용기간 : 제조일로부터 36개월(3년)

20

【취급상의 주의사항】

- 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(K.G.M.P)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개찰자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.
- 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보미담」 → 「의약품 등 정보」를 참조하세요.
- 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고미담 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알립니다.

21

작성년월일 : 2012년 08월 29일

이 첨부문서 작성일(2012년 08월 29일)이후 변경된 내용은 자사 홈페이지([www.kurwha.com](http://www.kurwha.com)) "안전성 정보"란에서 확인할 수 있습니다.

22



제조의회사  
**근화제약주식회사**

- 공 장 : 충남 공주시 경안면 청안농공단지길 55-8
- 본 사 : 서울특별시 송파구 방이동 1002(71억동)
- 소비자상담
- 전 화 : 1588-6077(유료)
- E-mail : SK-hcs@kurwha.com

제조사 **제이더블유중외제약(주)**  
충남 당진시 송악읍 한진길 56

23

집착면



071)0802932411520

정착면

광범위 경구용 항진균제 **100정**  
**아이트라 정** (이트라코나졸고체분산체)

- 【원료약품 및 그 분량】 1정 중 **진문의약품**  
이트라코나졸고체분산체(별구) ..... 253mg  
(이트라코나졸로서 100밀리그램)
- 【성상】 흰색 또는 미황색을 띤 원형 필름코팅정
- 【효능·효과/용법·용량/주의사항】 첨부문서 참조
- 【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
- 의약품정보 : 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보미담」, ... 「의약품 등 정보」 참조
- 제조의회사 : 근화제약(주) 충청남도
- 제조자 : 제이더블유중외제약(주) 충청남도