

전문의약품/분류번호 : 122

골격근이완제

페리슨 정(에페리손염산염)

Perrison Tablet (Eperisone HCl)

* 의약품은 어린이의 손에 놓지 않게 보관하여야 합니다.

* 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

* 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 : 에페리손염산염(KP) 50.0 mg

기타첨가제 : 대장경설플로로스, 스테아르산미그네슘, 오파드라이 흰색(03B28796), 유당수화물, 저치 환도히드록시드로필설플로로스, 콜로이드성이산화규소, 포비돈

【성상】 원형 괌름코팅정

【효능·효과】

1. 근골격계질환에 수반하는 둔통증 근육연속 : 경건완증후군, 건관절증후군, 요통
2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌형광경장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수술후 후유증(뇌척수 혈포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 축색경화증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수 혈관장애, 이금성 척수신경병변, 기타의 뇌척수질환

【용법·용량】

성인 : 에페리손염산염으로서 1회 50mg 1일 3회 식후에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 이 악에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근무력증 환자
 - 3) 이 악은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lap 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수증여(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 칙장에 환자간기능을 악화시킬 수 있다
3. 부작용
 - 1) 속 : 드롭게 속을 입으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 간장 : 드롭게 ALT, AST, ALP의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 3) 신장 : 드롭게 단백뇨, BUN의 상승 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 혈액 : 드롭게 백혈구 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 5) 과민증 : 때때로 발진, 드롭게 가려움 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 정신신경계 : 때때로 불면, 출음, 두통, 시지마비, 드롭게 몸의 굳어짐, 시지밀림 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통, 드롭게 복부부만감, 구내염 등이 나타날 수 있다.
 - 8) 비뇨기계 : 드롭게 오페, 오설금, 찬뇨감이 나타날 수 있다.
 - 9) 전신증상 : 때때로 두통감, 비剥夺감, 전신권태감, 드롭게 어지러움, 근긴장증하 등이 나타날 수 있다.
- 10) 기타 : 때로 만연홍조, 드롭게 발한, 부종이 나타날 수 있다.
- 11) 국내 시판 후 수십명의 중대한 이상사례 분석 평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 인정된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 면역계 : 아나필락시스반응
4. 일반적 주의
 - 1) 이 악 투여중에 무력감, 비剥夺감, 출음 등을 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다.
 - 2) 출음, 주의력, 침체증, 비수운동증 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 악을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

이 악의 유사약물인 투페리손염산염과 메토카르비돌을 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직이나 부득이하게 투여될 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】

30정/병, 500정/병

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필히 제품입니다. 만약 우통과정에서 사용기한이 경과되었거나
이후에는 품질, 유통, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 작성일
이후 변경된 내용은 '온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)'을 참조하십시오.

작성연월일 : 2018. 06. 05
소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-447-4700
E.J344-11

제조자: 국제약품(주)

경기도 안산시 단원구 산성로 47

제조의뢰자: (주)휴온스

충청북도 제천시 바이오밸리로 100

 Huons