

조제용

# 알마르정

(알마게이트)

500정

제조의뢰자 · 판매원

**Prime 한국프라임제약**

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

■ **원료약품 및 분량** 1정 중 · 유효성분: 알마게이트(KP) 500.0mg · 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유) · 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산 나트륨, 콜로이드성이산화규소 ■ **성상** 흰색의 장방형 정제 ■ **효능 · 효과** 다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선: 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림 ■ **용법 · 용량** 성인 및 12세 이상의 소아: 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요 시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

■ **사용상의 주의사항 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.**

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자 2) 알츠하이머병 환자 3) 치질 환자 4) 체액 저류(부기) 환자 5) 임신 중독증 환자 6) 설사 환자 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 테트라사이클린계 항생물질(함께 복용 시 흡수를 억제할 수 있음)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람: 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수 · 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다. (1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제: 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2 ~ 3 시간 간격을 두고 복용한다. (2) 살리실산염: 신장의 배설을 증가시킨다.
- 2) 신장애 환자: 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장애 환자에게는 권고되지 않는다.
- 3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람: 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인 산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음. 4) 고령자 5) 혈액구도 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계: 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

■ **저장방법** 밀폐용기, 실온보관(1~30℃) ■ **제조사** 한국코러스(주) - 충청북도 제천시 강저로 30

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

■ 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

■ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

제조번호

사용기한