

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

일반의약품

분류번호 : 315

KGMP 적격업체제품

# 마그토닉 염질 캡슐

## 【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

산화마그네슘(KP)	250mg
(마그네슘으로서 150.8mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	500mg
(비타민 E로서 500 IU)	
셀레늄함유건조효모(KPC)	20mg
(셀레늄으로서 10.8ug)	

■ 첨가제(타르색소) : 황색 5호, 청색 1호, 적색40호

【성상】 희백색 또는 미황색의 점조성 내용물이 든 적갈색의 연질캡슐제

## 【효능 · 효과】

○ 다음경우의 비타민 E의 보급

- 노년기

· 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)

○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법 · 용량】 12세 이상 및 성인: 1일 2회 1회 1캡슐

## 【사용상의 주의사항】

### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음과의 약을 복용하지 마십시오.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

### 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자
- 6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
- 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성유제를 신중히 투여해야 하는 환자

### 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

- ① 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐) ② 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하  
③ 피부염, 땀, 호흡, 시 악취, 탈모, 조급증, 구토
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기)등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 5) 항암도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 6) 우발적으로 과량복용한 경우

- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

### 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 녹차, 흥차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 훈제되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(~30°C)보관

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【제조자】 (주)동구제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

【판매자】  일양약품주식회사 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변폐 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 10월 02일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

☏ 소비자 상담실 (080)612-8690

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.