

근육경련 및 혈액순환개선제

연질캡슐 토마셀

[성분 · 함량] 1캡슐 중

토코페롤아세테이트(KP).....500.0mg

(비타민E로서 500IU)

셀레늄함유간조효모(발균).....20.0mg

(셀레늄으로서 33µg)

산화마그네슘(KP).....250.0mg

(마그네슘으로서 150mg)

첨가제(타르색소) : 적색 40호, 황색 5호, 청색 1호

첨가제(연질캡슐기제) : 젤라틴(소, 가축), 속산산젤라틴(소, 가축)

첨가제(식물유래성분) : 대두유(공기름)

[성상] 회백색 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

[효능 · 효과] 다음경우의 비타민 E 의 보급

- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목걸림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)

- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

[사용상주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 일레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 입부

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 일레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부부패감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 붉은 반점, 부전 수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리되거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막 뭉침) 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막뭉침)증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증(Hyponatremia : 혈액중에 나트륨이 과잉으로 존재하는 상태), 울혈성부전(CHF : 심장기능 저하로 신체조직이나 기관에 혈액을 공급할 수 없는 상태, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증(Hyperkalemia : 혈중의 칼륨농도가 정상 이상으로 과도하게 높아지고 있는 상태)을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

6) 우발적으로 과량복용 한 경우.

7) 개별 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 일반적 주의

1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야한다.

8. 저장상의 주의사항


- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[소비자상담실] 080-700-8487

[포장단위] 자사포장단위



• 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오소된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

• 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

• 설명서 개정일자이후 변경된 내용은 식약처온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

• 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.