

# 살라이트더블 정

(방풍통성산건조엑스(4.6→1))

분류번호 : 219

### 【원료약품 및 그 분량】1정(760밀리그램) 중

- 유효성분 : 방풍통성산건조엑스(4.6→1)(별규)..... 475.00밀리그램
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 탈크, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스 2910, 디아세틸레이티드모노글리세리드, 산화티탄

### 【성상】

미백색의 원형 필름코팅정

### 【효능·효과】

배에 피하(피부밑) 지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 제 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 흉조), 비만, 부기, 변비

### 【용법·용량】

보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이에)에 복용한다.

### 【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
  - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 총혈작용에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있다.)
  - 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
  - 다른 설사약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 고혈압 환자
- 심장에 또는 신장애(신장장애) 환자
- 부종(부기) 환자
- 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 땀이 많이 나는 환자(땀과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
- 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 배뇨(소변을 놓)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 갑상선기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 지금까지 약에 의한 발진, 발적(충열되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 우려가 있다.)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
  - 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 배합량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
  - 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
  - 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
  - 피부 : 발진, 발적(충열되어 붉어짐), 가려움 등이 나타나는 경우.
  - 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등.
  - 비뇨기계 : 배뇨(소변을 놓)장애
  - 간기능 장애 : ST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰이 충분하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 1개월 정도(변비에 복용하는 경우 1주일 정도) 복용하여도 증상이 개선이 없을 경우

### 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것
- 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것
- 다른 한약제제 등과 병용(함께 복용(사용)) 투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용(함께 복용(사용))투여 시 특히 주의할 것
- 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제(티록신, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)과 병용(함께 복용(사용)) 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 복용할 것.
- 칼륨함유제제, 갑초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

### 6. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

### 【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

### 【사용기간】

제조일로부터 36개월

### 【포장단위】

360정/병

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품의 상세정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805(무료전화서비스)

제조·판매원

**명문제약주식회사**

경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26  
www.mmpfarm.co.kr

〈설명서 작성년월일 : 19. 07. 17〉

(M01)