

케어담^정

근육 뭉침과 통증을 한번에!

일반의약품 분류번호: 114

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

클로르록사존(KP)	150 mg
에텐자미드(KP)	150 mg
카페인수화물(KP)	25 mg (카페인이로서 22.88mg)

【효능 및 효과】

신경통, 요통(허리통), 어깨결림

【용법 및 용량】

성인 1회 1-2정 1일 2회 등용(통증) 또는 발작시에 복용한다.

【성 상】

흰색의 장방형 필름코팅정

【저 장 방 법】

밀폐용기, 실온(1-30 ℃)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염 (코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 (첫아이), 유아 및 어린이 (14세 이하).
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람.
- 5) 고령자(노년).
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것.
- 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시킬 것.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 헛기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 3) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 10정

【제 조 자】 조아제약(주)

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12

공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

【수신자부담금과객상담실】 080-988-8888

- ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 접달하십시오.