

# 칼키나제정

(칼리디노게나제)

KKN 2015.04.10-01

전문약품  
분류번호: 219

# 칼키나제정

(칼리디노게나제)

Kalkinase Tab.

### 【원료약품의 분량】 1정 중

칼리디노게나제(동물유래성분 : 돼지, 돼장)(JP) ..... 50 IU  
첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 적색3호  
동물유래성분 : 무수유당(소, 우유)

### 【성상】 적색 원형의 장용성 필름코팅정

### 【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

### 【용법·용량】

1일 30~150IU를 3회 분할하여 경구투여 경구투여 한다(먹는다,복용한다).  
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

### 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
  - 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것  
이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 부작용
  - 1) 과민증 : 때때로 발진, 드물게 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
  - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
  - 3) 소화기계 : 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
  - 4) 기타 : 때때로 열감, 드물게 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.
4. 고령자(노인)에 대한 투여  
일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

### 【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

### 【포장단위】 자사포장단위

### 【제조사】 영동제약(주) (인천광역시 남동구 함박로 333)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2015년 04월 10일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지([www.wooridulpharm.com](http://www.wooridulpharm.com))또는 소비자상담실(080-080-4211)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.  
KKN 2015.04.10-01