

글리틴[®]정
(콜린알포세레이트)

Glitin[®]Tab.
(Choline alfoscerate)

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(약 790mg) 중

유효성분: 콜린알포세레이트(KP)..... 400mg
* 기타첨가제: 콜로이드성이산화규소, 메타규산알루미늄산마그네슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 푸마르산스테아릴나트륨, 히프로멜로오스, 산화티탄, 폴리에틸렌글리콜6000, 탈크, 폴리비닐알코올, 산화제이철(황색), 시메티콘

【성상】

담황색의 달걀형 필름코팅정제

【효능·효과】

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
- 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자극과민성, 주위무관심
- 노인성 가성우울증

【용법·용량】

콜린알포세레이트로서 1회 400mg을 1일 2~3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 이상반응
 - 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
 - 소화기계: 위염, 위질환
 - 정신신경계: 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 90정(10정/PTP*9)

본제품은 인습성이 있으므로 PTP포장상태로 보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.

제조의뢰 및 판매원

제일약품(주) 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7(B동 외)

제조원 일부공정위탁제조 (주)다산제약 충청남도 아산시 도고면 덕암산로 342

일부공정위탁제조 (주)과마킹 충청북도 음성군 감곡면 행군이길 87-17

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부담:080-555-7171)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화:080-333-6312)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

"설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilpharm.co.kr) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다."

주의 사항 : 글리틴정 400mg의 "원내조제" 및 "원의 약국 조제"시에는 반드시 PTP상태로 환자에게 제공하고, 환자가 복용 전에 한 알 씩 PTP에서 개봉하여 복용하시기 바랍니다.

설명서작성년월일 : 2019. 01. 09
1AY-B-0090-U1-07