

그리아틴정

(콜린알포세레이트)

■ 원료약품 및 그 분량 1정 중

- 유효성분 : 콜린알포세레이트(KP) 400mg
- 기타첨가제 : 메타규산알루미늄삼마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산삼마그네슘, 오파드라이 노란색 (200F620010), 이산화규소, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜4000

■ 성상 담황색의 장방형 필름코팅정

■ 효능·효과

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군
- : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소

■ 용법·용량

콜린알포세레이트로서 1회 400 mg을 1일 2~3회 경구투여한다.
증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

2. 이상반응

- 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
- 2) 소화기계 : 위염, 위질한
- 3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다

3. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

■ 저장방법 · 사용기간

기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위

90정/상자(10정/PTP x 9)

■ 제조의뢰자 · 판매원

메디스제약(주) - 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

■ 제조자

한국프라이머제약(주) - 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

본 제품은 인습성이 있으므로 PTP포장상태로 보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

■ 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

■ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

소비자상담실 (02) 6077-3012 / <http://www.medixpharm.com>

개정일자: 2023.02.03(Rev.09)