47mm

1P



2P

100mm

93mm


전문의약품 POM
처방전 의사보관
아트졸정
(이트리자니그고제분산체)
전문 의약 품
일본한호갑3
[용법 · 용량]
① 수면유도 및 단기 수면장애 치료 목적으로 취침 전 1회 100 mg을 투여한다.
② 수술 전 불안 치료 목적으로 수술 전 1회 100 mg을 투여한다.
③ 수면유도 및 단기 수면장애 치료 목적으로 취침 전 1회 100 mg을 투여한다.
④ 수술 전 불안 치료 목적으로 수술 전 1회 100 mg을 투여한다.
[사용상의 주의사항]
1. 투여 중 운전 등 위험한 기계 조작 또는 작업에 종사하는 사람에게 주의를 주어야 한다.
2. 다른 진정제, 수면제 또는 알코올 음료와 함께 복용하지 않도록 주의한다.
3. 간장애 환자에게 투여하는 경우 간기능 검사를 실시하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 투여한다.
4. 신장애 환자에게 투여하는 경우 신기능 검사를 실시하는 등 환자의 상태를 관찰하면서 투여한다.
5. 고령자에게 투여하는 경우 환자의 상태를 관찰하면서 투여한다.
6. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게 투여하는 경우 치료상의 이익이 위험을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
7. 수유부에게 투여하는 경우 수유를 중지하는 등 적절한 조치를 취한다.
8. 소아에 투여하는 경우 안전성이 확립되어 있지 않다.
9. 과민증 환자에게 투여하지 않는다.
10. 다른 약제와 병용하는 경우 다음 약제에 주의한다.
[병용금기] 삼환계 항우울제, 페노티아진계 항정신병제, 부티로페논계 항정신병제, 벤조디아제핀계 항불안제, 벤조디아제핀계 수면제, 바르비탈계 수면제, 항히스타민제, 알코올 함유 제제
[병용주의] 중추신경계 억제제, 항히스타민제, 알코올 함유 제제
11. 이 약 복용 시 졸음, 현기증 등이 나타날 수 있다.
12. 이 약 복용 시 술을 마시지 않도록 한다.
[이상반응] 1. 중대한 이상반응 : 간기능 이상, 황달, 간염, 간부전, 혈소판감소증, 백혈구감소증, 무과립구증, 호중구감소증, 범혈구감소증, 재생불량성빈혈, 횡문근융해증, 악성증후군, 세로토닌증후군, 신장애, 요폐, 호흡억제, 무호흡, 저혈압, 서맥, 심정지, 혼수, 발작, 경련, 정신병적 증상, 환각, 착란, 흥분, 공격적 행동, 자살기도, 자살사고, 자살충동, 의존성, 금단증상, 과민증후군
2. 기타 이상반응
(1) 혈액계 : 혈색소 감소, 적혈구 감소, 빈혈, 혈소판 증가, 백혈구 증가, 호산구증가, 림프구 감소, 단핵구 증가, 혈액응고시간 연장, 프로트롬빈시간 연장, 부분트롬보플라스틴시간 연장
(2) 간장계 : AST 상승, ALT 상승, 알칼리포스파타제 상승, 콜린에스테라제 증가, 황달, 간염, 간부전, 담즙정체성 간염, 간손상, 간세포성 황달, 혼합성 간손상
(3) 신장계 : 혈중 요소질소 증가, 혈중 크레아티닌 증가, 요폐, 빈뇨, 핍뇨, 혈뇨, 단백뇨, 요로폐색
(4) 호흡기계 : 호흡억제, 무호흡, 저산소혈증, 폐렴, 간질성 폐렴, 폐부종, 기관지경련, 천명, 기침, 호흡곤란, 흉통, 객혈, 폐색전증, 폐경색, 폐고혈압
(5) 순환기계 : 저혈압, 서맥, 심정지, 혼수, 심부전, 심근경색, 심방세동, 심실조기수축, 심실빈맥, 심실세동, 심전도이상, 부정맥, 심근허혈, 심근병증, 심막삼출, 심막염, 심낭압전, 혈전색전증, 혈전증, 혈관염, 혈관통증, 혈관확장, 혈관수축, 혈관부종, 혈관외유출