

모더페시아® 정 1mg
피나스테리드 (Finasteride 1mg)

전문 의약품
분류번호:267

【성분·함량】 1정 중

피나스테리드(MP) 1.0mg

첨가제(타르색소) : 청색2호 알루미늄레이크

【성상】 양면이 볼록한 팔각형 모양의 황갈색 필름코팅정제

【효능·효과】

성인 남성(만 18~41세)의 남성형 탈모증(안드로겐 탈모증)의 치료

【용법·용량】

일반적으로 피나스테리드로서 1일 1회 1mg을 경구투여하며, 식사와 관계없이 투여할 수 있다. 용량을 증량하면 유효성이 증대된다는 근거가 없다. 일반적으로 3개월 이상 복용하여 치료효과를 볼 수 있으며, 치료효과 유지를 위해 지속적으로 복용할 것을 권장한다. 치료 기간과 유효성을 지속적으로 평가해야 한다. 복용을 중단하면 12개월 내에 치료효과는 사라지게 된다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 1) 이 약을 소아환자 혹은 여성에게 투여하여서는 안 된다(소아에 대한 투여량 및 일부에 대한 투여량 참조).
 - 2) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약의 부수진 조작용을 만지는 경우, 피부를 통해 이 약이 흡수되어 남성에 대해 위험을 초래할 가능성이 있으므로 임부나 임신했을 가능성이 있는 여성은 이 약의 부수진 조작용을 만져서는 안 된다. 이 약의 표면은 코팅되어 있으므로 정제가 부서지지 않은 상태에서 정상적으로 취급할 때에는 주성분과 접촉하지 않는다(임부에 대한 투여량 참조).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 : 이 약과 같은 5 α -환원효소 억제제는 테스토스테론이 디하이드로테스토스테론으로 전환되는 것을 저해하므로 임부가 이 약을 복용하는 경우 남성에 대해 외부생식기의 비정상성을 초래할 수 있다. 따라서 임신중에 이 약을 복용하였거나 이 약 복용중에 임신하게 된 경우에는 남성에 대해 잠재적 위험성을 환자에게 알려주어야 한다(경고항, 임부에 대한 투여량 참조). 암컷 캣에게 임신기간중동안 이 약의 저용량을 투여하였을 때 수컷 사산자 외부생식기의 비정상성이 초래되었다.
 - 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대해 과민반응을 나타내는 환자
 - 3) 양성전립샘비대증 등으로 인해 이 약 5mg 또는 다른 5 α -환원효소 억제제를 복용하고 있는 환자
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 이 약은 간에서 광범위하게 대사되므로 간기능에 이상이 있는 환자에 대해서는 주의하여 투여한다.
4. 이상반응
 - 1) 남성형 탈모증 환자에게 이 약 1mg을 투여한 임상시험 12개월에 걸친 3개의 대조임상시험에서, 투약군 중 1.4%의 환자가 악물과 관련가능성이 있거나 상당히 관련되어 있거나 관련성이 명백히 있다고 보고된 이상반응으로 인하여 임상시험도중 탈락되었으며 투약군에서는 1.2%, 위약군에서는 0.9%의 환자가 악물 투여로 인한 성능기능 관련 이상반응 때문에 임상시험에서 탈락되었다(위약군 : n = 934중 1.6%) 이 약 혹은 위약을 각각 12개월간 투여하였을 때 1% 이상의 빈도로 나타난 이상반응 중 악물과 관련가능성이 있거나 상당히 관련되어 있거나 또는 관련성이 명백히 있다고 보고된 이상반응을 표에 나타내었다.

표 1. 피나스테리드 1mg을 남성 탈모증 환자에게 1년간 투여하였을 때 악물관련성 이상반응(%)	이 약(n=945)	위 약(n=934)
성욕감퇴	1.8	1.3
발기부전	1.3	0.7

사정장애(사정약감소)	1.2(0.8)	0.7(0.4)
악물관련성 성능기능 관련 이상반응으로 인해 중단	1.2	0.9

이상반응 분석결과를 종합해 보면 이 약을 투여받은 945명의 환자 중 36명(3.8%)이, 위약을 투여받은 934명 중 20명(2.1%)이 1개 이상의 성능기능 관련 이상반응을 경험하였다(p = 0.04). 성능기능 관련 이상반응으로 인하여 투약을 중단한 경우, 투약 중단 후에는 모든 환자에서 이러한 이상반응이 사라졌으며, 투약을 계속한 환자의 대부분에서 이상반응이 사라졌다.

건강한 남성에게 이 약 혹은 위약 1일 1회 1정을 49주간 투여한 임상시험에서 사정역감소량의 증감값은 각각 0.3 mL(-1%), 0.2 mL (-8%)였다. 이 약의 5배 용량(5mg/일)을 투여한 다른 두 임상시험에서 사정역감소량의 증감은 위약투약군과 비교 시 약 0.5 mL(-25%) 또는 유사한 감소를 보였으나, 이러한 현상은 투약을 중단하면 회복되었다. 임상시험에서 보고된 유방압통, 비대, 과민반응 및 고통통의 유병율은 투약군과 위약군에서 유사하였다.

- 2) 이 약 5mg을 투여한 임상시험 4년간의 위약대조 임상시험(PLESS, Proscar Long-Term Efficacy and Safety Study)에서 45세에서 78세의 전립샘비대 환자(중상유무와 무관) 3,040명을 대상으로 4년에 걸친 안전성 평가를 실시하였다. 이 약 5mg으로 치료한 3.7%(67명의 환자), 위약으로 치료한 2.1%(32명의 환자)가 성능기능 관련 이상반응으로 치료를 중단하였으며, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 성능기능 관련 이상반응이었다. 4년간의 임상시험에서 위약보다 높은 빈도로 발현하였고 이 약 5mg에서의 발현율이 1% 이상이었으며 임상시험결과에 의해 악물과 관련가능성이 있다, 상당히 관련되어 있거나, 분명히 관련되어 있다고 간주된 이상반응은 다음 표2와 같았다. 임상 시험 2~4년에서는 투여군간 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애 발현율에 유의한 차이가 없었다.

피나스테리드 5mg을 전립샘비대 환자에게 투여시 악물관련 이상반응	1년 (%)		2~4년 (%)	
	피나스테리드 5mg (n=1,524)	위 약 (n=1,516)	피나스테리드 5mg (n=1,524)	위 약 (n=1,516)
발기부전	8.1	3.7	5.1	5.1
성욕감퇴	6.4	3.4	2.6	2.6
사정약감퇴	3.7	0.8	1.5	0.5
사정장애	0.8	0.1	0.2	0.1
유방비대	0.5	0.1	1.8	1.1
유방압통	0.4	0.1	0.7	0.3
발진	0.5	0.2	0.5	0.1

< 표 2 >

전립샘 비대증 환자에게 이 약 5mg을 투여한 1년간 위약대조, 3상 임상시험과 5년간 수행된 공개 확장시험에서의 이상반응 프로파일은 유사하였다. 이 약 5mg의 투여기간 증가함에 따라 이상반응이 증가하지 않았다. 투여기간 동안 새로운 악물 관련 성능 이상반응의 보고가 감소하였다.

3,047명의 환자를 대상으로 4~6년간 수행한 위약 및 양성대조 임상시험에서, 이 약 5mg을 투여한 투약군에서 4건의 유방암이 발생하였고, 위약군 및 양성대조군에서는 발생하지 않았다. 별도로, 3,040명을 대상으로 4년간 수행한 위약대조 임상시험에서 위약군에서 2건의 유방암이 발생하였고 이 약 5mg 투약군에서는 발생하지 않았다. 18,882명의 건강한 남성이 참여한 7년간의 위약대조임상시험(Prostate Cancer Prevention Trial, PCPT)에서 이 약 5mg 투약군에서 1건의 유방암이 발생하였고, 위약군에서도 1건의 유방암이 발생하였다. 이 약 1mg과 5mg에서 남성 유방암에 대한 시판 후 보고가 있다. 이 약의 장기간 투여와 남성유방 신생물간의 관련성은 현재 알려져 있지 않다. PCPT 임상시험은 직장수검사에서 정상이고 PSA 수치가 <3.0 ng/mL인 55세 이상 18,882명의 남성이 참여한 7년간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 임상시험이었다. 남성들은 이 약 5mg 또는 위약을 1일 1회 투여 받았다. 환자들은 매해 직장수검사 및 PSA를 평가받았으며, 생체조직검사는 PSA가 상승되거나 직장수검사에서 비정상적으로 나온 경우와 임상시험 마지막에 시행되었다. 위약을 투여받은 남성(1.1%)에 비해 이 약을 투여받은 남성(1.8%)에서 Gleason 등급 8~10의 전립샘암의 발생빈도가 더 높았다. 다른 5 α -환원효소 억제제(테타스테리드)에 대한 4년간의 위약대조 임상 시험에서도 Gleason 등급 8~10의 전립샘암에 대한 유사한 결과가 관찰되었다(1% vs 테타스테리드 vs. 위약 0.5%). 이 약 1mg을 투여받은 남성에서의 임상적 유의성은 알려져 있지 않다.

- 3) 시판 후 다음과 같은 이상반응이 추가로 보고되었다. 이 이상반응은 불특정 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 발생빈도를 신뢰성 있게 예측하거나 악물-뇌졸중과의 인과관계를 확립하는 것은 일반적으로 가능하지 않다.
 - 면역계 : 발진, 가려움, 두드러기 및 혈관부종(안진, 혀, 목구멍 및 얼굴)의 증상을 포

항)과 같은 피반분용

- 정성제: 우울증, 투여 중단 후 지속되는 성욕감퇴
- 생식계 및 유방: 유방암 등 비대; 고환증, 투여 중단 후 지속되는 성기능 장애(발기부전, 사정장애), 오르가즘 장애; 남성 불임 그리고/또는 정액의 질 저하. 이 약 투여 중단 후 정액의 질 정상화 혹은 개선이 보고되었다; 남성 유방암
- 위장장애(메스카림, 어지럼, 두통, 두근거림, 간호소 수치 상승

5. 일반적 주의

- 1) 의사는 환자에게 멍을, 통증 및 유두분비물, 유방비대, 압통 및 신장물을 포함한 유방의 변화가 있을 경우 신속히 의사에게 보고하도록 안내한다.
- 2) 의사는 이 약으로 치료하는 동안 일부 환자에서 사정능이 감소할 수 있다는 것을 환자에게 알려야 한다. 이런 사정장애는 정상적인 성기능을 방해하는 것으로 보이지는 않지만 이 약으로 치료를 받는 환자에게 발기부전과 성욕감퇴가 발생할 수도 있다.
- 3) 직장수지검사상 정상이고 PSA 수치가 <3.0 ng/mL 인 55세 이상의 남성을 대상으로 7년간 이 약 일일 5 mg을 복용한 PCPT 임상시험에서 Gleason 등급 8~10의 전립샘암 위험률이 증가되었다(피타스타티드 1.8 % vs 약 1.1 %). 다른 5 α -환원효소 억제제(두타스테리드) (1 % 두타스테리드 vs 0.5 % 위약)에 대한 4년간의 위약대조 임상시험에서도 비슷한 결과가 관찰되었다. 5 α -환원효소 억제제는 고등급 전립샘암 발진에 위험성을 증가시킬 수 있으나, 전립샘 부피를 감소시키기 위한 5 α -환원효소 억제제 효과 때문인지, 이러한 연구들의 결과에 영향을 미치는 다른 요인들 때문인지는 확립되지 않았다.
6. 상호작용 임상적으로 중요한 약물상호작용은 밝혀진 바가 없다. 이 약은 CYP-450 관련 약물 대사와효소계에는 영향을 끼치지 않고 알려졌다. 안티피린, 디곡신, 글리부리드, 글리클로클라리드, 프로프라놀롤, 테오필린 및 외르파린 등과 이 약의 상호작용 조사를 위한 임상시험을 실시한 바 있으나, 유의한 상호작용이 관찰되지 않았다. 비록 상호작용에 관한 연구를 실시하지는 않았으나, 임상시험시 이 약 1 mg 혹은 그 이상의 용량은 아세트아미노펜, 아세틸살리실산, α -차단제, 진통제, ACE저해제, 항경련제, 벤조디아제핀, β -차단제, 칼슘채널 차단제, Cardiac nitrates, 이노제, H2 길항제, HMG-CoA 환원효소 저해제, Prostaglandin synthetase 저해제(NSAIDs) 및 항콜론제 항균제와도 임상적으로 유의한 이상반응 없이 병용하여 사용되었다.

7. 임부에 대한 투여

- 1) 이 약을 여성에게 투여하여서는 안된다.
- 2) 임신한 랫트에게 이 약을 100 mcg/kg/일~100 mg/kg/일의 용량범위(사람에서의 상용량의 5~5,000 배)로 투여하면 수컷 차산자에서의 요도하열(hypospadias)의 발생률이 투여용량에 비례하여 3.6~100 %로 증가되었다. 이 약 30 mg/kg/일 이상의 용량(사람에서의 상용량의 1.5 배 이상)을 임신한 랫트에게 투여하면 전립샘과 정낭의 무게가 감소되고 포피분기가 지연되며, 일시적인 유두발육을 보이는 수컷 차산자가 생성되었다. 또한 3 mcg/kg/일 이상의 용량(사람에서의 상용량의 1/4)을 임신한 랫트에게 투여하면 항문과 생식사이의 거리가 감소된 수컷 차산자가 생성되었다. 이러한 효과들이 수컷 랫트에게 유도되는 시기는 임신 16~17일 사이인 것으로 밝혀졌다. 위의 변화들은 type II 5 α -환원효소 억제제 계열에 속한 약물들의 약리학적 효과로, 선천적으로 type II 5 α -환원효소가 결핍된 남성유아에서 보고된 바와 유사하다. 지금까지에서 이 약의 다양한 용량에 노출된 적이 있는 암컷 차산자에서는 비정상적 소견이 발견되지 않았다.
- 3) 이 약을 투여받은 수컷 랫트(80 mg/kg/일, 사람에서의 상용량의 488 배)와 이 약을 투여받지 않은 암컷 랫트를 교미시켜 생산된 제 1세대 수컷 및 암컷 차산자에는 발생상의 비정상적 소견이 관찰되지 않았다. 임신후기 및 수유기간인 3 mg/kg/일의 용량(사람에서의 상용량의 150 배)을 투여시에는 제 1세대 수컷 차산자의 수태능이 경미하게 감소하였으나, 암컷 차산자에는 아무런 영향이 없었다. 임신 6~18 일 사이에 자궁 내에서 이 약의 100 mg/kg/일의 용량(사람에서의 상용량의 5000 배)에 노출된 토끼의 태아에서는 초기형의 증거를 발견할 수 없었다. 그러나 이 시험에서는 생식계 발생시기동안 이 약에 노출되지 않았으므로 수컷 생식기에 대한 영향을 기대할 수 없었다.
- 4) 배자 및 태아 발생시기동안 자궁 내에서 이 약에 노출되었을 때의 효과는 랫나 토끼에 비해 사람의 발생과정에서의 영향을 더 잘 예측할 수 있게 해주는 동물모델인 리저스 원숭이에서 평가되었다(임신 20~100 일). 임신한 원숭이에게 800 ng/일의 용량(1 mg/일의 용량을 복용하는 남성의 정액으로부터 여성에게 노출될 수 있는 이 약 최고 용량의 250 배 이상)을 정맥투여했을 때 수컷 태아에서의 비정상적 소견은 관찰되지 않았다. 사람 태아의 발생 과정에서의 영향을 예측하기 위해 원숭이 모델을 사용하는 것이 적절함을 확인하기 위하여 이 약 2 mg/kg/일을 임신한 원숭이에게 경구투여했을 때, 수컷 태아 외부생식기에서의 비정상적 소견이 관찰되었다. 수컷 태아에서의 다른 이상은 발견되지 않았으며, 암컷 태아에서는 어떤 투여 용량에서도 이 약과 관련된 이상은 관찰되지 않았다.

8. 수유부에 대한 투여

이 약을 여성에게 투여하여서는 안된다. 이 약이 유즙으로 분비되는지 여부는 알려져 있지 않다.

9. 소아에 대한 투여

이 약을 소아 환자에게 투여하여서는 안된다. 소아에서의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다.

10. 고령자에 대한 투여 이 약은 65세 이상의 환자를 대상으로 유효성에 대한 임상연구를 실시하지 않았다. 이 약 5 mg을 투여한 약동학자료를 근거할 때 이 약을 고령자에게 투여시 용량조절이 필요없다. 그러나, 이 약은 고령자에 대한 유효성이 확립되어 있지 않다.

11. 임상검사항목의 영향

18~41세 환자를 대상으로 하여 실시한 이 약의 임상시험에서 혈청내 전립샘 특이 항원(PSA)의 평균값이 0.7 ng/mL에서 12개월째에는 0.5 ng/mL로 감소되었다. 이 약을 전립샘비대증을 가진 고령자에게 사용할 때에는 PSA 수치가 약 50 % 감소한 바 있다. 이 약을 복용하고 있는 동안 PSA 수치를 검사한 경우에는 그 결과수치를 적절하게 해석하는 것을 고려하여야 한다.

12. 광량투여시의 처치

임상시험시에 이 약 400 mg을 1회 복용하거나 80 mg/일의 용량으로 3개월간 복용한 경우에도 이상반응은 발생하지 않았다. 추가정보가 수집되기 전까지는 이 약 광량복용시에 특이한 처치법으로 회향할 만한 방법은 없다.수컷 및 암컷 마우스에 1,500 mg/m²(500 mg/kg)의 용량으로 3회 경구투여하거나 암컷 및 수컷 랫트에게 2,360 mg/m²(400 mg/kg), 5,900 mg/m²(1000 mg/kg)을 각각 1회 경구투여한 경우에는 유의한 치사를 이 관찰되었다.

13. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 차고원인이 되거나 품질저하에서 비롯되지 않으므로 이를 주의한다.

14. 기타

- 1) 발달성 수컷 랫트에게 160 mg/kg/일, 암컷 랫트에게 320 mg/kg/일까지 24개월간 투여하였을 때 종양형성을 나타내지 않았다. 이 용량은 사람 권장용량인 이 약 1 mg/일을 투여한 남성의 전신노출량의 각각 888배와 2,192배에 해당한다. CD-1 마우스를 이용한 19개월간 발달형성 연구에서 250 mg/kg/일의 용량(사람노출량의 1,824배)에서 통계학적으로 유의한 수준(p<0.05)의 고환의 레이디드(Leydig) 세포분열의 증가가 관찰되었다. 25 mg/kg/일의 용량(사람 노출량의 184배)을 투여한 마우스와 40 mg/kg/일의 용량(사람 상용량의 312배)을 투여한 랫트에서 레이디드 세포의 증식과 혈장 LH 수치 상승(약육배)도 2~3배이 확인되었다.
- 2) 생체외 배터리에 돌연변이 시험, 포유류 돌연변이 시험 또는 생체외 알칼리 용출시험에서 변이형성이 관찰되지 않았다. 생체외 염색체 이상시험에서 이 약의 고농도(450~550 μ mol)를 Chinese hamster ovary cell에 투여하였을 때 염색체 이상이 약간 관찰되었다.
- 3) 수태능 손상 성적으로 성숙한 수컷 랫트에게 이 약 80 mg/kg/일(사람 노출량의 488배)을 6주 또는 12주 후에 배양에 대하여 유의한 영향을 미치지 않았다. 24주 또는 30주까지 지속 투여하였을 때, 생식능과 수정능의 확실한 감소와 정낭과 전립샘 무게의 유의성 있는 감소가 관찰되었다. 이러한 모든 변화는 투여중단 6주 내에 거의적으로 회복되었다. 이 약을 투여한 랫트에서 생식기능의 감소는 부속 생식기관(전립샘과 정낭)에 대한 효과로 정액전(seminal plug)을 형성하지 못하여 생성되는 2차적인 결과이다. 정액전 없는 랫트의 정상적 수태능에 필수적 요소이며 사람과 관련되어 있지 않다.

【포장단위】 30정

【저장방법】 밀폐용기, 습기를 피하여 15~30°C 보관

- * 본품을 구입할 때 배송기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

【판매처】 (주)더유 서울특별시 구로구 경인로 397 7F, 8F

- 【제조처】 제이더를유중의제약(주) 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 56
- 【제조지위처】 (주)다산메디칼 충청남도 아산시 도고면 덕암산로 342
- 【제품문의처】 (주)다산메디칼 080-850-5206 (수신자부담)

최초공개년월일: 2015.05.22
20150602/00

제조의약품
DASAN
THE PHARMACEUTICAL CO., LTD.
(주)다산메디칼
충청남도 아산시 도고면 덕암산로 342