항궤양 복합제

트리비스정

전문의약품

항궤양 복합제

트리비스정

전문의약품

전문의약품
분류번호 232

항궤양 복합제

트리비스정

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 라니티딘염산염(라니티딘으로서 75mg)(USP) 84mg
  비스무트시트르산염칼륨(KP) 100mg
  (산화비스무트로서 40.5mg, 칼륨으로서 12mg)
  수크랄페이트수화물(USP)(지당육다황산에스테르로서1002mg) 300mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 산화티탄, 탤크, 폴리에틸렌글리콜4000, 코팅비도, 크로스포비돈, 메타규산알루민산마그네슘

【성　　상】 이약은 원형의 흰색 필름코팅정제이다.

【효능·효과】
위 · 십이지장궤양, 위염, 즙굉거-엘리손증후군, 역류성식도염, 미처진 투약(맹젤슨증후군 예방), 수술후 궤양, 비스테로이드성진통제(NSAID)로 인한 위 · 십이지장궤양

【용법 · 용량】
1. 성인
보통 식사와 무관하게 1회 2정을 1일 2회 오전 및 취침전에 경구투여한다.
1) 위 · 십이지장궤양 : 1회 2정을 1일 2회 투여하거나 1회 4정을 1일 1회 취침전에 투여한다. 특히 십이지장궤양환자에 대해서 1회 4정 1일 2회 오전 및 취침전에 투여한편 보다 높은 치료율을 얻을 수 있다. 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드소염진통제 장기 투여시 위 · 십이지장궤양발생을 예방하기 위한 병용요법에 있어서도 유용은 같다. 보통은 4주 이내 비스테로이드소염진통제 투여로 인한 질환은 보통 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 연장될 수도 있다. 이 약의 단기요법으로 효과가 우수하였던 재발성 궤양환자들에 대해서는 유지요법으로 1회 2정을 1일 1회 취침전에 투여한다.
2) 역류성식도염 : 8주동안 1회 2정, 1일 2회 투여하거나 1회 4정을 1일 1회 취침전에 투여한다. 단 중증 역류성식도염 환자에 대해서는 1회 4정을 1일 4회로 증량할 수 있다.
3) 즙굉거-엘리손 증후군 : 초기용량으로서 1회 2정을 1일 3회로 치료를 시작하여 필요에 따라 증량할 수 있다. 증증질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 라니티딘으로써 6g까지 부여할 수 있다.
4) 소화성 궤양 급성 스트레스성 궤양 및 급성 위점막 병변에 의한 상부소화관 출혈 : 경구 투여가 가능해지면 주사제에서 경구투여로 전환하여 1회 2정을 1일 2회 투여한다.
5) 미처진 투약(맹젤슨증후군 예방)
미처투도 2시간 전에 1회 2정을 투여한다. 이 경우 수술전야에도 1회 2정을 투여하면 더욱 좋다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지말것.
1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자 3) 급성 포르피린증 병력이 있는 환자(라니티딘염산염이 급성 포르피린성 발작을 유발할 수 있음을 시사하는 임상 보고가 드물게 있다) 4) 신장에 환자 5) 상부 위장관 수술 환자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 7) 아숙이, 신생아 8) 합틀 제한 식이요법 환자
2. 다음의 경우에는 신중이 투여할 것.
1) 간장애 환자 2) 약물 과민반응의 병력이 있는 환자 3) 고령자 4) 신장애의 병력이 있는 환자 5) 비스테로이드소염진통제를 병용 투여하고 있는 환자(특히 고령자 및 소화궤양의 병력이 있는 환자에서 이 약과 병용 투여할 경우 주기적인 관찰이 필요하다) 6) 이 약은 위암 증상을 은폐할 수 있으므로 특히, 위궤양 환자, 새롭게 또는 최근 변화된 소화불량증을 보이는 중년 이상의 환자는 치료전에 악성이 아닌 것을 확인한 후 투여한다. 7) 헬리코박터 파일로리 양성인 위 · 십이지장궤양 환자 : 세균박멸을 위한 노력이 필요하다. 8) 중증의 중환자실 환자에수크랄페이트 투여 후 위식의 생성이 보고되었다. 9) 저인산혈증 환자에수크랄페이트의 알루미늄은 소화관 내에서 인산염과 결합하여 흡수를 저해한다 10) 상처고린 환자에수크랄페이트 투여 후 호흡기 합병증이 보고되었다
3. 이상반응
이상반응 발현 빈도는 다음과 같이 분류된다. : 매우 흔하게 (≥ 1/10), 흔하게 (≥ 1/100, < 1/10), 흔하지 않게 (≥ 1/1,000, < 1/100), 드물게 (≥ 1/10,000, < 1/1,000), 매우 드물게 (< 1/10,000) 1) 소크 : 매우 드물게 아나필락시스 쇼크가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 주의 깊게 관찰하고 만약 이러한 증상이 나타난 경우 투약을 중지하고 적절한 조치를 하여야 한다. 이들 반응은 단회 투여 후에 보고되었다. 2) 과민반응 : 드물게 피부발진, 두드러기, 혈관신경부종, 발열, 가려움증, 저혈압, 흉통 등의 과민반응, 혈관부종 등의 증상이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타난 경우에는 투여를 중지한다. 이들 반응은 단회 투여 후에 보고되었다. 3) 혈액계 : 혈액 회자에서 과립구감소증이 보고된 바 있으나 가역적이며 매우 드물게 가역적인 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있고 혈청 호소체 상승(혈청 크레아티닌, 혈청 아미노전달효소)이 나타날 수 있다. 드물게 무과립구증, 범혈구감소증이 보고되었고 범혈구감소증이 나타난 환자에게 가금골수형성저하증 또는 골수무형성증, 재생불량성 빈혈이 함께 보고되었다. 매우 드물게 투약성 면역용혈성빈혈이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지한다. 혼혈지 않게 출산과 증가가 나타날 수 있다. 초기증상으로 전신권태감, 무력, 피하 · 점막하 출혈, 발열 등이 나타나면 혈액검사를 실시하여 이상이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 4) 간장 : 드물게 일시적이고 가역적인 AST · ALT · γ-GTP · ALP의 상승이 나타날 수 있고 매우 드물게 가역적인 황달성 또는 비황달성 간염간세포성, 간내담성 또는 혼합형) 등 간기능장애가 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지한다. 5) 순환기계 : 드물게 HZ 수용체 길항제에 의한것처럼, 매우 드물게 빈맥, 서맥, 방실차단, 조기심실수축과 같은 부정맥이 보고되었다. 매우 드물게 발한증이 보고되었다. 8) 소화기계 : 흔하지 않게 구역, 구토, 변비, 설사, 복부팽만감, 복통, 드물게 식욕부진의 증상이 나타날 수 있다. 대변색이 변색 또는 검은색으로 되는 이는 환자에서 비스무트설페이드 형성에 기인되는 것으로 병도로 치료할 필요가 없다. 7) 정신신경계 : 매우 드물게 어지럼, 졸림, 가역성의 혼란상태, 경련, 흥분, 불면, 두통(때때로 중증), 두중감, 방심, 불안, 주로 중증 및 고령자에서 가역적 정신혼동, 우울증 및 환각 등의 증상이 나타날 수 있다. 매우 드물게 초운면의로 추정되는 가역적인 혼란 사례과 불수의 운동장애가 보고 된 바 있다. 의식장애, 경련감각성 등) 간대성 근경련이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하거나 적절한 처치를 한다. 특히 신기능 장애를 지니고 있는 환자에서 쉽게 나타날 수 있으므로 주의한다. 8) 내분비계 : 매우 드물게 여성형유방증 및 유즙분비과다와 같은 유방관련 증상 및 상태, 가역적인 발기부전 및 성욕감퇴 등이 보고된 바 있으나 이 약과의 인과관계는 확립되지 않았다. 9) 시세논 분비 경쟁 : 라니티딘은 일부 양이온계로 제거되기 때문에, 동일 경로로 제거되는 다른 약물의 청소율에 영향을 줄수 있다. 라니티딘 고용량에 출량키 네리슨 증후군 치료 시은 프로카인아미드 및 N-아세틸프로카인아미드의 배설을 감소시켜 이들 약물의 혈장 농도를 증가시킬 수 있다. (3) 위 pH의 변화 : 어린 약물의 생체이용률에 영향을 줄수 있으며, 이는 흡수 증가에 트리아졸린, 디다졸린 글리피지드 또는 흡수 감소에, 케토코나졸, 이트라나비어, 엘라비르단, 게재프니브를 유발할 수 있다. 2) 라니티딘이 아목사실린, 메트로니다졸과 상호작용을 일으키다는 증거는 없다. 3) 수크랄페이트는 뉴퀴놀론계 항균제시프로플록사신염산염, 노르플록사신 등), 디곡신, 페니토인, 테트라사이클린, 테오필린 등과 동시에 복용함으로써 병용약제의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용약제 투여후 가급적 2시간 이상 시간간격을 두고 투여한다. 4) 비스무트서브트라살릴론은 제산제에 의해 효과가 감소될 수 있으므로 이 약 투여 전후 30분 동안에는 제산제를 투여하지 않는다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는다.
2) 모유중으로 이행하므로 수유부에는 투여하지 않는다.
7. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성과 유효성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
8. 임상검사치에 대한 영향
시험지법에 의한 요단백검사에서 거짓양성이 나타날 수 있으므로 설포살라실산으로 실험하는 것이 바람직하다.
9. 과량투여시의 처치
외국에서 1일 6 g(라니티딘으로서)까지 과량투여 보고가 있었으나 특히 중대한 영향은 나타나지 않았다. 이러한 경우에는 최토, 위세척을 행함과 동시에 적절한 치료를 행한다. 필요하면 혈액투석에 의하여 제거해도 좋다.
10. 기타
1) 라니티딘의 투여로 인해 위산의 분비가 줄고 위장 내 세균 증식이 촉진될 수 있다.
2) 동물의 흡수 배설시험에서 안구멀라난과 친화성이 있다는 보고가 있으므로 장기투여시 안과적 검사를 행하는 등 주의하여 투여한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 300정/병

※ 부작용보고 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래 위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1806-02

첨부문서 최초 작성년월일 2015. 09. 11
첨부문서 최종 개정년월일 2018. 06. 21

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.com) 및 식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

제조의회사 : 동성제약주식회사
[본　사] 서울 도봉구 도봉로 683
[공　장] 충남 아산시 둔포면 관대안길 45
소비자 상담번호 080-001-0921
www.dongsung-pharm.com

제조자 : ㈜대웅제약
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 1