

포켓사이즈 고품량 기능성 비타민

오라비텐^정 B₁₀

비타민B 10종 함유

오라비텐정은 고품량의 비타민B 10종, 항산화 성분, 아연 및 UDCA가 함유된 기능성 비타민입니다. 비타민은 식이습관이나 생활습관의 불균형, 만성질환에 따른 약물의 장기간 복용, 노화 등 다양한 원인에 의하여 소모됩니다. 이로 인해 발생하는 구내염, 체력저하, 육체피로 및 눈의피로 등에 복용하여 효과를 나타냅니다.

- ▶ 에너지 생성 과정에 필요한 **고품량의 비타민B군 10종** 함유
- ▶ 몸 안에서 빨리 배출되지 않고 생체이용률이 높은 **활성형 비타민, 벤프티아민 50mg** 함유
- ▶ 항산화 성분 **비타민C-E 및 셀레늄** 함유
- ▶ 성장·면역기능에 필요한 미네랄인 **아연**, 간기능개선을 위한 **UDCA(우르소데옥시콜린산)**가 함유되어 있습니다.

오라비텐정은

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중,

벤프티아민 (KP)	50mg
(티아민염산염으로서 36.15mg)	
리보플라빈 (KP)	50mg
니코틴아미드 (KP)	50mg
판토텐산칼슘 (KP)	50mg
피리독신염산염 (KP)	50mg
폴산 (KP)	0.2mg
시아노코발라민 (KP)	0.05mg
이노시톨 (KP)	50mg
콜린타르타르산염 (DAB)	50mg
α-비오틴 (USP)	0.25mg
아스코르브산과립 (별규)	31.25mg
(아스코르브산으로서 30mg)	
토크페롤이세테이트 2배산 (BP)	20mg
(비타민D로서 10IU)	
산화아연 (KP)	18.7mg
(아연으로서 15mg)	
셀레늄함유건조효모 (KP)	46.3mg
(셀레늄으로서 25μg)	
우르소데옥시콜산 (KP)	15mg

[성상] 노란색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음의 경우 비他命 E, B₁, B₂, B₆, C 의 보급
 - 육체피로
 - 임신수유기
 - 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비他命 등의 효능효과는 다음과 같다.
 - 1) 비他命 B₁(벤프티아민)
 - 다음 증상의 완화: 신경통 근육통 관절염(오동, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 2) 비他命B₆(리보플라빈), 비他命B₁₂(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화: 구강염(입피리염, 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염.
 - 3) 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 2장씩 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose

intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucos e-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노중 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아.
- 4) 소화장애, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장 질환 환자.
- 5) 심장-순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석에 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우.

위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변
 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
 피부염, 맘호흡시 악취, 탈모, 조급증

2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 파라독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는

능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간소성을 일으킬 수 있다.

8) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성 부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

9) 항알도스테르제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

10) 우발적으로 과량복용 한 경우.

11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지켜 것.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 20T

[저장방법] 기밀용기, 실온(+30℃)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식약처온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>) 에서 확인 하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실

(☎080-777-5678; 수신자 요금 부담)로 문의주십시오.

제조사: 일리코제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소길 21
 설명서 최종 개정 연월일 : 2015.12.2

제조의뢰자

동국제약 Dongkook

충청북도 진천군 광혜원면 용소길 33-9