

※ 의약품 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

전문의약품	
분류번호	219
KGMP	적격업체

# 리마프론정

(리마프로스트알파텍스)

## 원료약품 및 그 분량 1정 중

리마프로스트알파텍스(IP) ..... 166.67 µg  
 (리마프로스트로서 5µg)  
 첨가제(동물유래) : 무수유당(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

## 성상

흰색의 원형 정제

## 효능·효과

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선

## 용법·용량

1. 폐색성혈전혈관염(버거병)에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 2정을 경구투여합니다.
2. 후천성 요부척추관협착증(SLR시험에서 정상이고, 양측성의 간헐파행을 보이는 환자)에 의한 자각증상(하지동통, 하지저림) 및 보행능력의 개선에는 통상 성인 1일 3회, 1회 1정을 경구투여합니다.  
 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

## 사용상의 주의사항

### 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(giucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

### 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 출혈경향이 있는 환자(출혈을 조정할 우려가 있습니다.)
- 2) 항혈소판제, 혈전용해제, 항응혈제를 투여중인 환자

### 3. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 소양감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등의 적절한 조치를 취하십시오.
- 2) 출혈경향 : 드물게 출혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여, 이상이 보이는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 3) 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 복부불쾌감, 복통, 식욕부진, 가슴쓰림, 드물게 구토, 복부팽만감이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 때때로 AST(GOT), ALT(GPT) 상승 등의 간기능 이상이 나타날 수 있습니다.
- 5) 순환기계 : 때때로 심계항진, 드물게 사지청색증, 저혈압이 나타날 수 있습니다.
- 6) 기타 : 때때로 두통, 안면홍조, 어지러움, 열감, 드물게 전신권태감, 부종, 유선종창, 몸떨림, 하지다모(下肢多毛), 빈혈이 나타날 수 있습니다.

### 4. 일반적 주의

- 1) 요부척추관협착증에 대해서는 증상의 경과를 관찰하여 지속투여의 여부를 결정하십시오.
- 2) 요부척추관협착증에서 수술을 받아야 할 정도의 중증례에서의 유효성은 확립되어 있지 않습니다.

### 5. 임부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 동물실험(임신한 원숭이·랫트에 정맥주사)에서 자궁수축작용이 보고되어 있습니다.

### 6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 없습니다).

### 7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

### 8. 기타

건강한 성인에게 대량투여(30~40µg/회)시 일시적인 혈압강하가 나타났다는 보고가 있습니다.

## 저장방법

기밀용기, 실온(1~30°C)보관

## 포장단위

84정

## 취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2017년 01월 23일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 본 제품은 흡습성이 우려되므로 PTP(Alu-Alu)포장 상태로 조제 및 보관하여 주시기 바랍니다.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2017. 01. 23  
1701-00

# 슈넬생명과학(주)

Schnell Biopharmaceuticals, Inc.

경기도 화성시 양감면 두머리길 16

제조의뢰자 : 슈넬생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16  
 제조자 : (주)넥스팜코리아 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41