

* 이 제품 사용 시 약제 사용 설명서와 함께 제공되는 약품 사용 설명서 꼭 읽어주세요.
* 함량차이 약량: 20%인 경우입니다.

듀카브정

30/5mg, 30/10mg
60/5mg, 60/10mg

진단용약품 용량강하게

용량/조도	함량/강하게
30/5mg	201603068
30/10mg	201603069
60/5mg	201603070
60/10mg	201603072

원료약품 및 구성 성분

원료약품	함량/강하게
30/5mg : 피마리프린트(수화물)염(비염)	75mg (피마리프린트(수화물) 30mg)
원료(피마리프린트(수화물)염(비염))	6.94mg (원료(피마리프린트(수화물)염(비염)) 30mg)
30/10mg : 피마리프린트(수화물)염(비염)	75mg (피마리프린트(수화물) 30mg)
원료(피마리프린트(수화물)염(비염))	13.88mg (원료(피마리프린트(수화물)염(비염)) 30mg)
60/5mg : 피마리프린트(수화물)염(비염)	150mg (피마리프린트(수화물) 60mg)
원료(피마리프린트(수화물)염(비염))	6.94mg (원료(피마리프린트(수화물)염(비염)) 5mg)
60/10mg : 피마리프린트(수화물)염(비염)	150mg (피마리프린트(수화물) 60mg)
원료(피마리프린트(수화물)염(비염))	13.88mg (원료(피마리프린트(수화물)염(비염)) 10mg)

성질

원료약품	함량/강하게
30/5mg : 환형 아미노산 유도체 복합 정제	"발상"염(비염)
30/10mg : 환형 아미노산 유도체 복합 정제	30/5mg A33 F33
60/5mg : 환형 아미노산 유도체 복합 정제	30/10mg A31 F31
60/10mg : 환형 아미노산 유도체 복합 정제	60/5mg A65 F65
60/10mg : 환형 아미노산 유도체 복합 정제	60/10mg A10 F10

효과

피마리프린트(수화물)염(비염)은 혈액이 적혈구에 조립되지 않는 빈혈성 고혈압

용법

- 성년
 - 1) 성인 고혈압 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 이 약은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
 - 2) 30/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
 - 3) 30/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
 - 4) 60/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
 - 5) 60/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 고혈압
 - 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 부작용
 - 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 주의사항
 - 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.

사용상 주의사항

1. **경증**
 - 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
2. **다음 환자에는 투여하지 마시오.**
 - 1) 이 약을 복용할 수 없는 다른 약물과 함께 복용할 수 없는 환자
 - 2) 알레르기 반응(알레르기성 비염, 천식 등)이 있는 환자
 - 3) 신장기능 장애(신장장애)가 있는 환자
 - 4) 동맥경화 질환(동맥경화)이 있는 환자
 - 5) 당뇨병이 있는 환자
 - 6) 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
 - 7) 12세 이하의 소아 환자에게 투여하지 마시오.
3. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
 - 1) 빈혈이 있는 환자
 - 2) 신장기능 장애(신장장애)가 있는 환자
 - 3) 동맥경화 질환(동맥경화)이 있는 환자
 - 4) 당뇨병이 있는 환자
 - 5) 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
 - 6) 12세 이하의 소아 환자에게 투여하지 마시오.
4. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
 - 1) 빈혈이 있는 환자
 - 2) 신장기능 장애(신장장애)가 있는 환자
 - 3) 동맥경화 질환(동맥경화)이 있는 환자
 - 4) 당뇨병이 있는 환자
 - 5) 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
 - 6) 12세 이하의 소아 환자에게 투여하지 마시오.

4. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
 - 1) 빈혈이 있는 환자
 - 2) 신장기능 장애(신장장애)가 있는 환자
 - 3) 동맥경화 질환(동맥경화)이 있는 환자
 - 4) 당뇨병이 있는 환자
 - 5) 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
 - 6) 12세 이하의 소아 환자에게 투여하지 마시오.
5. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
 - 1) 빈혈이 있는 환자
 - 2) 신장기능 장애(신장장애)가 있는 환자
 - 3) 동맥경화 질환(동맥경화)이 있는 환자
 - 4) 당뇨병이 있는 환자
 - 5) 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
 - 6) 12세 이하의 소아 환자에게 투여하지 마시오.
6. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
 - 1) 빈혈이 있는 환자
 - 2) 신장기능 장애(신장장애)가 있는 환자
 - 3) 동맥경화 질환(동맥경화)이 있는 환자
 - 4) 당뇨병이 있는 환자
 - 5) 임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
 - 6) 12세 이하의 소아 환자에게 투여하지 마시오.

- 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 2) 30/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 3) 30/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 4) 60/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 5) 60/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.

- 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 2) 30/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 3) 30/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 4) 60/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 5) 60/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.

발현부위	발현빈도	이러한 경우	발현부위
신장기능 장애	흔하지 않음	이러한 경우	신장기능 장애
동맥경화 질환	흔하지 않음	이러한 경우	동맥경화 질환
당뇨병	흔하지 않음	이러한 경우	당뇨병
임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자	흔하지 않음	이러한 경우	임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
12세 이하의 소아 환자에게 투여	흔하지 않음	이러한 경우	12세 이하의 소아 환자에게 투여

발현부위	발현빈도	발현부위
신장기능 장애	흔하지 않음	신장기능 장애
동맥경화 질환	흔하지 않음	동맥경화 질환
당뇨병	흔하지 않음	당뇨병
임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자	흔하지 않음	임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
12세 이하의 소아 환자에게 투여	흔하지 않음	12세 이하의 소아 환자에게 투여

- 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 2) 30/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 3) 30/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 4) 60/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 5) 60/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.

- 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 2) 30/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 3) 30/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 4) 60/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 5) 60/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.

발현부위	발현빈도	발현부위
신장기능 장애	흔하지 않음	신장기능 장애
동맥경화 질환	흔하지 않음	동맥경화 질환
당뇨병	흔하지 않음	당뇨병
임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자	흔하지 않음	임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
12세 이하의 소아 환자에게 투여	흔하지 않음	12세 이하의 소아 환자에게 투여

발현부위	발현빈도	발현부위
신장기능 장애	흔하지 않음	신장기능 장애
동맥경화 질환	흔하지 않음	동맥경화 질환
당뇨병	흔하지 않음	당뇨병
임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자	흔하지 않음	임신 중이거나 임신할 계획이 있는 환자
12세 이하의 소아 환자에게 투여	흔하지 않음	12세 이하의 소아 환자에게 투여

- 1) 환자는 1회 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 2) 30/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 3) 30/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 30/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 4) 60/5mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/5mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.
- 5) 60/10mg 정제 : 피마리프린트(수화물)염(비염)은 60/10mg 정제와 함께 복용하며 1일 2회 복용한다. 기능성 빈혈 증상은 1정 또는 2정씩 아침에 식사후에 복용하며 1일 2회 복용한다.

저장방법	직접투입용, 실온(15~30°C)보관	포장형태	30정용, 300정용
------	----------------------	------	-------------

소제약사(주) 신약개발팀 | 080-708-9088 | 창립부서 생성일자 : 2016년 05월 31일

