

엑세타민

고단위 비타민보급 육체피로, 눈건조감, 체력저하

일반의약품

1캡슐

A E C
B₁ B₂ B₆
연질캡슐

제조사:  동구바이오제약

제조의회사:  씨엘팜

- 원료약품의 분량(1캡슐중) 유효성분: 니코틴산아미드(KP) 20mg, 리보플라빈(KP) 3mg, 아스코르브산(KP) 60mg, 티아민염산염(KP) 2mg, 리타놀필티레이트(KP) 5000 I.U., 토코페롤아세테이트(KP) 10mg(비타민 E로서 10 I.U.), 피리독신염산염(KP) 3mg
- 기타 첨가제: 농글리세린, 백랍, 렉시틴, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 적색 산화철, 젤라틴, 콩기름, 팜유

- 성 상: 광각색의 내용물이 충전된 암적갈색의 광방형 연질캡슐
- 효능·효과: 다음경우의 비타민 A, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급 *육체피로 *임신·수유기 *병중·년후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 *노년기 *이 약에 함유된 비타민등의 효능·효과는 다음과 같다.▷눈의 건조감의 완화 ▷마장증(밤에 잘 못 보는 증상)

- 용법·용량: 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용
- 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 ● 소비자상담실: 02-466-7007
- 제조·회사 주소: 충청남도 아산시 신창면 가내길 101 (주)씨엘팜
- 제조자 주소: 경기도 화성시 향남읍 계막공단2길18 (주)동구바이오제약
- *만약 구입시 사용기한이 경과되거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.

- 사용기간: 제조일로부터 36개월
- 이 문안 작성일자(2020년 6월 9일)이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품정보검색
- 사용상 주의사항

- 1) 경고 (1) 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형물 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외).
- 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 3개월 미만의 젖먹이 (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (4) 풍 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 3) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. (1) 레보도파 4) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태) (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신전 3개월 부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통을 중심으로 하는 기형 발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료를 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 시중 등으로부터의 섭취량이 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만 에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. (4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 (5) 고지단백혈증, 당뇨병성 고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유체를 신중히 투여해야 하는 환자 5) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 극각 중지할 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증 성 관절염, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 묽은 대변 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500mg -2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초 신경계의 기능저 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (7) 장기간 고용량의 비타민 A(베타 카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈연성증) 위험을 높일 수 있다. (8) 우발적으로 과량복용 한 경우 (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 6) 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 (2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다. (3) 각종 요염사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에도 영향을 줄 수 있다. (5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경구용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 7) 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 적사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (일피하여) 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

제조번호:

사용기한:



(08806226002956)