

* 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어아하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

첨부문서 작성일자 : 2019년 5월 31일

보령 콜린알포세레이트정

전문의약품

품목기준코드:
201606606

원료 약품 및 그분량 1정 중

유효성분 : 콜린알포세레이트(KP) 400mg

첨가제[동물유래성분] : 유당수화물(소, 우유)

기타첨가제 : 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스보마돈, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(200F620010)

성상 담황색의 장방형 필름코팅정

효능·효과

- 뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
- 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자각과민성, 주위무관심 • 노인성 가성우울증

용법·용량 콜린알포세레이트로서 1회 400 mg을 1일 2~3회 경구투여합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이상반응

- 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여합니다.
- 2) 소화기계 : 위염, 위질한
- 3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 적개심, 신경질, 경련, 운동과다

3. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 90정(10정/PTP×9)

* 만약 구입 당시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. * 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boyoung.co.kr 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다. * 약품용 용어설명 및 기타 자세한 약품정보는 약품통합정보시스템 (nedug.mfds.go.kr)를 참조하시기 바랍니다. * 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사건)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(0644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기간에 약품 복용 파취구제 신청을 하실 수 있습니다. * 사용(유효)기간이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

본 제품은 인습성이 있으므로 PTP포장상태로 보관 및 통제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2019년 5월 31일

보령제약

제조외리 및 판매자 : 보령제약(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

제조자 : 한국프라임제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100