

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.  
 1) 이 약은 복부 팽만감, 구역, 변비 또는 설사가 발생할 수 있으며 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것. 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항  
 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 위산 농도가 저하된 경우 이 약의 포만효과가 감소하거나 소실될 수 있다.

6. 저장상의 주의사항  
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 정해진 보관조건에서 보관하도록 하며, 유효기간이 지난 약은 복용해서는 안 된다.

**【저장방법】** 밀폐용기, 실온(1~30℃)에서 보관하세요.

**【사용기한】** (연,월,일) 하단 표시일까지

**【첨가제】**

미결정셀룰로오스, 시트르산수화물, 경질무수규산, 포비돈, 라우릴 황산나트륨, 침강탄산칼슘, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 탈크, 폴리에틸렌글리콜6000, 오파드라이 흰색(85F18422), 적색산화철

**【제조외지사】** ㈜레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

**【제조사】** ㈜한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

\* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
 \* 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)  
 \* 소비자상담전화 : 031-692-2900  
 \* 작성일자(2020. 03. 03.(Rev.3)) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템 (nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

일반의약품

체중감량 보조제

아르닌 정

(알긴산/카르복시메틸셀룰로오스나트륨)

300정

 (주)레고켐제약  
LegoChemPharma



(01)08806562047819

일반의약품 정보

**【유효성분】** 1정 중

• 알긴산(BP) ..... 200 mg  
 • 카르복시메틸셀룰로오스나트륨(KP) ..... 100 mg

**【성 상】** 연한 빨강색의 장방형 필름코팅정제

**【효능·효과】** 음식물 섭취 감소를 통한 체중감량의 보조요법

**【용법·용량】** 1일 3회 2정씩 식전에 복용하고 필요에 따라서는 취침 전에 추가로 2정 복용가능하다. 충분한 양의 물과 함께 복용하는 것이 좋다. 권장량을 최소 3~4주간 복용할 것이 권장된다.

**【사용상의 주의사항】**

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.  
 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자 3) 유·소아
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.  
 다른 약물과 상호작용을 방지하기 위해 다른 약과 동시에 복용하지 않는 것이 좋으며, 복용할 경우 30분~1시간의 간격을 두고 복용하는 것이 권장된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 임부 및 수유부 2) 소화기 장애 환자 →

제조번호 :

사용기한 :

40\*15mm