



※ 의약품을 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

정우향사평위산정(단미엑스혼합제)

일반의약품 / 분류번호 : 233

[제품명] 정우향사평위산정(단미엑스혼합제)

[원료약품 및 분량] 1회 용량(400mg/정×5정)

창출연조엑스(1.5~1.8→1)(별규)(창출로서 2.50g)	1.505g
진피연조엑스(1.9~2.3→1)(별규)(진피로서 1.25g)	0.604g
향부자연조엑스(1.5~1.8→1)(별규)(향부자로서 1.25g)	0.751g
지실연조엑스(1.8~2.2→1)(별규)(지실로서 1.00g)	0.514g
곽향연조엑스(3.0~3.7→1)(별규)(곽향으로서 1.00g)	0.301g
후박연조엑스(5.6~6.8→1)(별규)(후박으로서 0.88g)	0.143g
사인연조엑스(4.0~4.9→1)(별규)(사인으로서 0.88g)	0.199g
복향연조엑스(1.2~1.4→1)(별규)(복향으로서 0.63g)	0.495g
김초연조엑스(2.3~2.8→1)(별규)(김초로서 0.63g)	0.246g
생강연조엑스(6.1~7.4→1)(별규)(생강으로서 0.50g)	0.077g
- 건조엑스로서 1.814g -	

*동물유래성분 : 루디프레스(유당수화물/소/우유)

*기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 실리콘디옥사이드, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 피마자유

[성상] 갈색의 원형 필름코팅 정제

[효능 · 효과] 한방건강보험용

[용법 · 용량] 한방건강보험용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 악은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장애 또는 신장애(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 침부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 김초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨

혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 칼륨함유제제, 김초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프게 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

본 의약품은 KGMG 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 밟힌 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2018년 03월 07일 이후 변경된 내용은 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 문의(☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.