



※ 의약품을 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보존하세요

일반의약품
분류번호:114

머슬펜 정

【원료약품의 분량】 1정(700mg) 중

유효성분	
아세트아미노펜(KP).....	300.0mg
클로르록사존(USP).....	250.0mg
첨가제 (동물유래성분)	
유당수화물(소,우유)	
기타첨가제	
미량성분(폴리옥소, 스테아르산그리세올, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스	

【성상】 흰색의 장원형 정제

【효능 및 효과】 신경통, 근육통, 관절통, 요(하리)통, 열치(疳)통, 건통(아깨골절, 어깨통증), 근(근육)경련, 근(근육)경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제 질환

【용법 · 용량】 성인: 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈 속)시를 피하여 복용한다.
만경, 중상에 따라 적절히 증감한다.

【포장 단 위】 10정/PTP

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 강하게 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사위 상담해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제제와 함께 복용하여 일일 최대용량 (4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

4. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심한 간·신장예(신장장애) 환자

2) 알레르기 환자 또는 약을 알레르기가 있었던 환자

5. 부작용

- 1) 과민증: 두드러기, 발적(종혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 두약을 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 경상출혈(출혈성), 반상출혈(피부에 검보갓빛 얼룩덜룩이 생기는 내반출혈), 요변색(소변색이 변함) 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스증상이 나타날 수 있다.
- 2) 간장: 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 두약을 중지한다.
- 3) 소화기: 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.
- 4) 신경정신계: 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 이익이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.

7. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제의 병용(합제 복용(사용))투여시 작용약이 나타나므로 신중히 투여한다.

■ 자세한 사항은 서릉의약품연구소의 의약품통합정보시스템(<http://medrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제 조 원】 한국신텍스제약(주) / 전폭 약산업 사기금 산단오봉길 106

【판매원】 일양약품 / 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

【소비자상담실】 063-853-8110

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

