

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

마그톤EX 이엑스 (연질캡슐)

일반 의약품
분류번호 : 319
KGMP적격업체제품

[성분·함량] 1캡슐 중

- 유효성분: 토코페롤아세테이트(비타민E로서 500IU)(KP).....500.00mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 150.78mg)(KP).....250.00mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 10.8μg)(KP).....20.00mg

- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 황색5호, 청색호
- 첨가제(동물유래성분) : 속산산젤라틴(기원 : 돼지, 사용부위 : 가죽)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 공기름, 폴리소르베이트80, 황납

[성상] 회백색의 유상 내용물을 함유한 압갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E의 보급
 - 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우에는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환 환자
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 입부
 - 8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성

유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - ① 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진(총혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 부전수축(심장 박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 5) 할랄도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 6) 유발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

[제조사] 코스맥스바이오(주) / 충북 제천시 바이오밸리 3로 30

[제조의뢰자] 알리코제약(주) / 충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

[판매처] (주)녹십자 / 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

※ 의약품 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
 ※ 개정일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

☎ 학술정보문의 : 080-585-0004

개정연월일 : 2018.02.07
01/201802