

메디콘 600 정

## 【원료약품 및 분량】1정 중

- 유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)..... 600 mg
- 푸르셀티아민(KP)..... 60 mg
- 리보플라빈부타레이트(KP)..... 6 mg
- 니코틴아미드(KP)..... 60 mg
- 피리독신염산염(KP)..... 25 mg
- 판토텐산칼슘(KP)..... 15 mg
- 시아노코발라민1000배산(KP)..... 20 mg (시아노코발라민으로서 20 µg)
- 이노시톨(KP)..... 20 mg
- 콜린타르타르산염(USP)..... 20 mg
- γ-오리자놀(KP)..... 5 mg
- 기타 첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카르멜로오스나트륨, 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 탭실드갈색(59B346), 히프르멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 덩크

## 【성상】

갈색의 강방형 필름코팅정

## 【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub> 의 보급
  - 육체피로
  - 임신·수유기
  - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
  - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
  - 각기
  - 눈의 피로

## 【용법·용량】

만12세이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용하세요.

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증<sup>2</sup> 환), 신장(콩팥)질환 환자
  - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 3) 만 12개월 미만의 영아
  - 4) 신장(콩팥)결석 환자
  - 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
  - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
  - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
  - 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
  - 4) 신장(콩팥)장애 환자
  - 5) 저단백혈증 환자
  - 6) 감심배당체를 투여 중인 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
  - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
    - 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
  - 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
  - 3) 흡인이 부족한 환자에게 비타민 B<sub>12</sub>를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
  - 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
  - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
  - 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
  - 7) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
  - 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
  - 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
  - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
  - 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
  - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
  - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
  - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

## 【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

## 【포장단위】

45정/병

【제조자】(주)바스킨바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

【판매자】(주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

- ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변태·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제를 신청 할 수 있습니다.
- ※ 소비자상담전화: 031-692-2900
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.