전문의약품 | AG181221

헤파로드정
(테노포비르디소프록실)

분류번호 : 629(기타의 화학요법제)

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중
[유효성분] 테노포비르디소프록실숙신산 ····· 245.0 mg
[첨가제-타르색소] 식약처고시(첨의류색소)(청색호)
[첨가제-동물유래] 무수유당(소의 우유에서 유래)
[기타 첨가제] 정제피막지유, 미결정셀룰로오스, 어항산소시나트륨, 옥탈셀룰로오스, 오피드리이파란색(MOXA05070), 전호화전분, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨

■ 성상 : 연한 파란색의 이문드 모양의 필름코팅정

■ 효능·효과
1. 에이즈 감염
성인 및 12세 이상의 소아에서 HIV-1감염의 치료를 위해 다른 항레트로바이러스제제와 병용투여한다. 이 약은 테노포비르 함유 복합제제와 함께 복용하지 않는다.
2. 만성B형간염
성인 및 12세 이상 소아의 만성B형간염을 치료한다. 만성B형간염 치료를 위해 이 약으로 치료를 시작하는 경우, 사용상의 주의사항 중 '일반적 주의를 고려할 것'

■ 용법·용량
1. 성인 및 12세 이상의 소아(35kg 이상)
HIV-1 또는 만성B형간염 치료를 위해 1일 1회 1정테노포비르디소프록실정(245 mg) 복용한다. 음식물의 섭취와 상관없이 복용할 수 있다.
만성B형간염의 치료에서의 최적의 치료기간은 알려지지 않았다.
35kg 미만의 소아 만성B형간염 환자에 대한 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.
2. 신장애 환자
이 약을 중등도~중증의 신장애 환자에게 투여할 경우 약물 노출이 유의하게 증가한다. 따라서 기타 크레아티닌 청소율이 <50mL/min*인 환자의 경우 표 1을 참고하여 이 약의 복용 간격과 조절해야 한다. 이러한 복용 간격 조절 지침은 혈액 투석이 필요한 말기 신장애 환자를 포함하여 거의 기가 수준의 신장애가 있고 혈액투석 이외의 다른 치료법을 받지 않는 환자에서 얻어졌고자료이다. 혈액투석 환자 중 다른 신장애 환자에 대한 적절한 용량은 확립되지 않았다. 따라서 이러한 환자에 대한 안전성 및 유효성을 면밀히 모니터하여 권다경고자료.
경증 신장애 환자는 경우 복용 간격을 조절할 필요가 없으므로(크레아티닌 청소율 50~80mL/min) 계산된 크레아티닌 청소율과 혈청 인산을 참가적으로 모니터링해야경고자료.
표 1. 크레아티닌 청소율에 따른 복용 간격 조절

크레아티닌 청소율(mL/min)*				혈액 투석 환자
	≥50	30~49	10~29	
권장되는 1정 복용 간격	24시간마다	48시간마다	72~96시간마다	7일마다 또는 투석 약 12시간 후*

a. 이상계지법의 계산을 이용하여 계산된다.
b. 일반적으로 4주일에 약 4시간 동안의 3회 혈액 투석으로 기반하여 혈액질을 한 번 투여한다. 이 약은 투석이 끝난 후 투여해야 한다.
테노포비르의 약동학은 크레아티닌 청소율이 10mL/min 미만으로 혈액투석을 하지 않는 환자에서 평가된 바가 없으므로 이 환자에 대한 투여지침은 없다.
신장애가 있는 소아 환자에 대한 용량 권장을 위한 데이터는 없다.

■ 사용상의 주의사항
1. 경고
1) 유산증/지방간을 동반한 중증의 간비대증
이 약의 구성성분인 테노포비르를 포함한 뉴클레오사이드 유사체를 기타 항레트로바이러스 치료제와 병용요법으로 사용한 경우에 지방적인 사례를 포함한 중증의 간비대증이 보고되었다. 이들 사례 대부분은 여성에게서 나타났다. 비만 및 장기간의 뉴클레오사이드 노출이 위험요소일 수 있다. 간질환에 대해 알려진 임상적 증상 각별한 주의해야 하며, 일반적인 위험요소가 있어도 환자에서는 사례가 보고된 적이 없다. 유산증 또는 두드러진 간독성소견에 대한 어떠느 가능이로소의 성상이 없이 나타나는 간비대 및 지방증 포함)을 의심할 만한 임상적 또는 실험실적 이상이 나타난 환자에 대해서는 이 약의 투여를 중단해야 한다.
2) 치료 중단 후 간염 악화
이 약을 포함한 항HBV 치료의 중단은 간염의 징증과 검사 결과를 포함한 면밀한 관찰이 있을 수 있다. 치 이 약의 투여일 중단한 HBV 감염 환자는 수개월 이상 임상적 또는 실험실적 추적장사를 통해 간염의 모니터되어야 한다. 적합할 경우 B형 간염치료를 다시 시작할 수 있다.
3) 신장에 있을 또는 악화
테노포비르는 주로약으로 신장에서 배설된다. 이 약과 활성성분의 동일한 테노포비르디소프록실의 푸마르산염을 복용한 환자에서 급성 신부전증 및 관련시 증후군(중증의 저인산혈증을 동반한 신세뇨관 손상)을 포함한 신장애가 보고되었다.
치료를 시작하기 전 및 이후의 치료를 받는 동안 임상적으로 적합하게 모든 환자의 크레아티닌 청소율을 계산하는 것이 권장된다. 과거 어떠크비르 복제를 복용하던 중 신장애를 경험한 환자에 대해서는 신장에게 주의깊이 모니터링을 하여야 한다. 일반적인 위험요소가 있는 환자의 경우에는 적소한