남성형 탈모전문 치료제

피나온정1밀리그램 Finaon Tab.1mg

(피나스테리드) (Finasteride)

전문의약품

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 피나스테리드(USP) 1.0mg
- 첨가제(트로체스) : 청색2호 알루미늄레이크
- 첨가제(동일규격성분) : 유당수화물(기능원료 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타첨가제 : 라우릴황산나트륨, 셀룰로오스90, 스테아로산마그네슘, 오파드라이 분홍85G44100, 전분글리콜산나트륨

【성상】 황갈색의 입면이 볼록한 말끔한 모양의 필름코팅정

【효능 · 효과】
성인남성만 18 ~ 41세)의 남성형 탈모증(안드로겐 탈모증)의 치료

【용법 · 용량】
일반적으로 피나스테리드로서 1일 1회 1 mg을 경구투여하며, 식사와 관계없이 투여할 수 있다.
용량을 증량하는 것은 효과적이지 않다.
일반적으로 3개월 이상 복용해야 치료효과를 볼 수 있으며, 치료효과 유지를 위해 지속적으로 복용할 것을 권장한다. 치료 기간과 유효성을 지속적으로 평가해야 한다. 복용을 중단하면 12개월 내에 치료효과는 사라지지 못한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
1) 이 약을 소아·환자 혹은 여성에게 투여하려고 하는 한 단계소아에 대한 투여항 및 임부에 대한 투여항 참조).
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약의 부서진 조각을 만지는 경우, 피부를 통해 이 약이 흡수되어 남성태아에 위험을 초래할 가능성이 있으므로 임부나 임신할 가능성이 있는 여성은 이 약의 부서진 조각을 만지서는 안 된다. 이 약의 표면은 코팅되어 있으므로 정제가 부서지지 않은 상태에서 정상적으로 취급할 때에는 주성분이 흡수되지 않는다(임부에 대한 투여항 참조).
3) 기분변화와 우울증
피나스테리드 1mg을 투여한 환자에서 우울한 기분, 우울증이 보고되었고, 이보다는 적은 건수로 자살생각을 포함한 기분변화이 보고되었다. 정신적적 증상에 대해 환자를 관찰하고, 만약 환자에게 이러한 증상이 발생하는 경우 피나스테리드 투여를 중단하고 의료전문가에게 상담하도록 해야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 : 이 약과 같은 5α-환원효소 억제제는 테스토스테론이 디히드로테스토스테론으로 전환되는 것을 저해하므로 임부가 이 약을 복용하는 경우 남성태아 외부생식기인 비정상을 초래할 수 있다. 따라서 임산중에 이 약을 복용하였거나 이 약 복용중에 임신하게 된 경우에는 남성태아에 대한 잠재적 위험성을 환자에게 알려주어야 한다(경고항 임부에 대한 투여항 참조). 임부 랫트에게 임신기간동안 이 약의 저용량을 투여하였을 때 수컷 차신자 외부생식기의 비정상이 초래되었다.
2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대해 과민반응을 나타내는 환자
3) 알상선결핍(대표증 등으로 인해 이 외 5mg 또는 다른 5α-환원효소 억제제를 복용하고 있는 환자
4) 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency), 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등 유전적인 문제이 있는 환자에게 이 약을 투여해서는 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
이 약은 간에서 광범위하게 대사되므로 간기능에 이상이 있는 환자에 대해서는 주의하여 투여한다.

4. 이상반응
1) 남성형 탈모증 환자에게 이 약 1mg을 투여한 임상시험1개월에 걸친 3개의 대조임상시험에서, 투약군 중 1.4%의 환자가 약물의 관련가능성이 있거나 상당히 관련되어 있거나 관련성이 명백히 있다고 보고된 이상반응으로 투약이 임상시험도중 철회되었으며 위약투여군에서는 1.2%, 투약군에서는 0.9%의 환자가 약물 투여로 인한 성기능 관련 이상반응 때문에 임상시험에서 탈락되었다(위약군n= 934중 1.6%).

[표1] 피나스테리드 1 mg을 남성 탈모증 환자에게 1년간 투여하였을 때 약물-관련성 이상반응(%)

	이 약 n=945	위 약 n=934
성욕감퇴	1,8	1,3
발기부전	1,3	0,7
사정장애(시정액감소)	1,2(0,8)	0,7(0,4)
약물-관련성 성기능 관련 이상반응으로 인해 중단	1,2	0,9

이 약 혹은 위약을 각각 12개월간 투여하였을 때 1% 이상 빈도로 나타난 이상반응 중 약물과 관련가능성이 있거나 상당히 관련되어 있거나 또는 관련성이 명백히 있다고 보고된 이상반응을 표에 나타내었다. 이상반응 중단제결과를 종합해 보면 이 약을 투여받은 945명의 환자 중 36명(3.8%)이, 위약을 투여받은 934명의 환자 중 20명(2.1%)이 1개 이상의 성기능 관련 이상반응을 경험하였다(p=0.04). 성기능 관련 이상반응으로 인하여 투약을 중단한 경우, 투약중단 이후 소실되거나 이러한 이상반응이 사라졌으며, 투약을 계속한 환자의 대부분에서 이상반응이 사라졌다. 건강한 남성에게 이 약 혹은 위약 1일 1회 1정을 48주간 투여한 임상시험에서 사정액 감소량이 각각 0.3ml(-11%), 0.2ml(-8%)였다. 이 5mg 보다 용량이 적은 투여한 다른 두 임상시험에서 사정액 감소량과 중첩 같은 위약투여군과 비교시 약 0.5mL(-25%)로 유의한 감소를 보였으나, 이러한 현상은 투약을 중단하면 회복되었다(임상시험에서 보고된 유방암통 · 비대, 과민반응 및 고환통의 유병률은 투약군과 위약군에서 유사하였다).

2) 이 약 5mg을 투여한 임상시험4년간의 무작대조 임상시험[PLESS, Proscar Long-Term Efficacy and Safety Study)에서 453례에 78세의 전립샘비대 환자(중상유무와 무관) 3,040명을 대상으로 4년에 걸친 인전성 평가를 실시하였다. 이 약 5mg으로 치료한 3,7%(57명 중 환자, 위약으로 치료한 2.1%(32명의 환자가 성기능관련 이상반응으로 치료를 중단하였으며, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 성기능관련 이상반응이었다. 4년간의 임상시험에서 사정액 감소량은 각각 0.3ml(-11%), 0.2ml(-8%)였다. 이 5mg 보다 용량이 적은 투여한 다른 두 임상시험에서 사정액 감소량과 중첩 같은 위약투여군과 비교시 약 0.5mL(-25%)로 유의한 감소를 보였으나, 이러한 현상은 투약을 중단하면 회복되었다(임상시험에서 보고된 유방암통 · 비대, 과민반응 및 고환통의 유병률은 투약군과 위약군에서 유사하였다).

[표2] 피나스테리드 5mg을 전립샘비대 환자에게 1년간 투여하였을 때 약물-관련성 이상반응(%)

	1년째		2~4년째	
	피나스테리드5mg (n=1,524)	위약 (n=1,516)	피나스테리드5mg (n=1,524)	위약 (n=1,516)
발기부전	8,1	3,7	5,1	5,1
성욕감퇴	6,4	3,4	2,6	2,6
사정장애	3,7	0,8	1,5	0,5
사정장애	0,8	0,1	0,2	0,1
유방비대	0,5	0,1	1,8	1,1
유방압통	0,4	0,1	0,7	0,3
발진	0,5	0,2	0,5	0,2

전립샘 비대증 환자에게 이 약 5 mg을 투여한 1년간 위약대조, 3심 임상시험과 5년간 수행된 공개, 확장시험에서의 이상반응 프로파일은 유사하였다. 이 약 5 mg의 투여기간이 증가함에 따라 이상반응이 증가하지 않았다. 투여기간 동안 새로운 약물 관련 성기능 이상반응의 보고가 감소하였다. 3,040명의 환자를 대상으로 4~6년간 수행된 위약대조 임상시험에서 이 약 5mg을 투여한 특이군에서 4년의 유방암이 발생하였고, 위약군 및 양성대조군에서는 발생하지 않았다. 별도의 3,040명의 환자를 대상으로 4년간 수행한 위약대조 임상시험에서 위약군에서 2건의 유방암이 발생하였고 이 약 5 mg 투여군에서는 발생하지 않았다. 18,882명의 건강한 남성이 참여한 7 년간의 위약대조임상시험에서 위약군에서도 1건의 유방암이 발생하였다. 이 약 1mg과 5 mg에서 남성 유방암에 대한 시판 후 보고가 있다. 이 약의 장기간 투여와 남성유방 신생물간의 관련성은 현재 알려져 있지 않다.
PCPT 임상시험은 직장수지검사에서 정상이고 PSA 수치가 ≤3.0ng/ml인 55세이상 18,882명의 남성이 참여한 7년간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 임상시험이었다. 남성들은 이 약 5mg 또는 위약 1일 1회 투여받았다. 환자들은 매해 직장수지검사와 PSA를 평가받았으며, 생체조직검사는 PSA 수치 상승되거나 직장수지검사에서 비정상으로 나온 경우의 임상시험 마지막에 시행되었다. 위약을 투여받은 남성(1.1%)에 비해 이 약을 투여받은 남성(1.8%)에서 Gleason 등급 8~10의 전립샘암의 빈도가 더 높았다. 다른 5α-환원효소 억제제(투약스테리드)에 대한 4년간의 위약대조 임상 시험에서도 Gleason 등급 8 ~ 10의 전립샘암에 대한 유사한 결과가 관찰되었다(1% 투약스테리드 vs. 위약 0.5%). 이 약 1mg을 투여받은 남성에서의 임상적 유의성은 알려져 있지 않다.

3) 시판 후 다음과 같은 이상반응이 추가로 보고되었다. 이 이상반응은 불특정 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에 발생빈도를 신뢰성 있게 예측하거나 약물노출과의 인과관계를 확립하는 것은 일반적으로 가능하지 않다.
- 면역계 : 발진, 가려움, 두드러기 및 혈관부종(입술, 혀, 목구멍 및 얼굴의 종창을 포함)과 같은 과민반응
- 근골격계 및 연결조직 장애 : 근육통, 근무력증
- 정신계 : 우울증, 투여 중단 후 지속되는 성욕감퇴, 불안
- 생식계 및 유방 : 유방암통 및 비대, 고환통, 혈정액증: 투여 중단 후 지속되는 성기능 장애[발기부전, 사정장애, 오르기슴 장애; 남성불임 그리고/또는 정액의 질 저하, 이 약 투여 중단 후 장액의 질 정상화 혹은 개선이 보고되었다; 남성 유방암
- 위장장애(속쓰림), 어지럼, 두통, 두근거림, 간효소 수치 상승

5. 일반적 주의
1) 의사는 환자에게 얼굴 통증 및 유두분비물, 유방비대 압통 및 신생물을 포함한 유방의 변화가 있을 경우 신속히 의사에게 보고하도록 안내한다.
2) 의사는 이 약으로 치료하는 동안 일부 환자에서 사정량이 감소할 수 있다는 것을 환자에게 알려야 한다. 이런 시정량 감소가 정상적인 성기능을 방해하는 것으로 보이지는 않지만 이 약으로 치료를 받는 환자에게 발기부전과 성욕감퇴가 발생할 수도 있다.
3) 직장수지검사에서 정상이고 PSA 수치가 ≤3.0ng/ml인 55세이상의 남성으로 기간 이 약 일 5mg을 복용한 PCPT 임상시험에서 Gleason 등급 8~10의 전립샘암 위험성이 증가되었다 (피나스테리드 1.8% vs 위약 1.1%).다른 5α-환원효소 억제제(투약스테리드) (1% 투약스테리드 vs 0.5% 위약)에 대한 4년간의 위약대조 임상시험에서도 비슷한 결과가 관찰되었다. 5α-환원효소 억제제는 고등급 전립샘암 발전의 위험성을 증가시킬 수 있으나, 전립샘 부피를 감소시키기 위한 5α-환원효소 억제제 효과 때문인지, 이러한 연구들의 결과에 영향을 미치는 다른 요인들 때문인지는 확립되지 않았다.

6. 상호작용
임상적으로 중요한 약물상호작용은 밝혀진 바가 없다. 이 약은 CYP-450 관련 약물대사효소계에는 영향을 끼치지 않는다고 알려졌다. 안티피린, 디곡시, 디아제팜, 글리벤클리드, 프로프라놀롤, 티오벤린 및 와르파린 등과 이 약의 상호작용 조사를 위한 임상시험을 실시한 바 있으나 유의한 상호작용이 관찰되지 않았다. 비록 신호적으로 관련 연구를 실시하지는 않았으나, 임상시험시 이 약 1mg 혹은 그 이상의 용량은 아세트아미노펜, 아세틸살리실산, 시메티딘, 지놀제, ACE저해제, 항경련제, 벤조디아제핀-3-산다제, 칼슘채널차단제, Cardiac nitrates, 이뇨제, H2 길항제, HMG-CoA 환원효소 저해제, Prostaglandin synthetase 저해제(NSAIDs) 및 퀴놀론계 항균제와도 임상적으로 유의한 이상반응 없이 병용하여 사용되었다.

7. 임부에 대한 투여
1) 이 약을 여성에게 투여하여서는 안된다.
2) 임신한 첫째주에 이 약을 100mcg/kg/일~100mg/kg/일의 용량범위(시험에서의 상용량의 5~5,000배)로 투여하면 수컷 차신자에서의 모든하합(hypospadias)의 발생률이 투여용량에 의존하여 3,6~100%로 증가되었다. 이 약 30mcg/kg/일 이상의 용량(사람에서의 상용량의 1.5 배이상)을 임신한 랫트에게 투여하면 정상적인 생식기 외부기관의 발달이 저해되었으며, 일시적인 유두발달을 보이는 수컷 차신자가 생산되었다. 또한 3mcg/kg/일 이상의 용량(사람에서의 상용량의 1/4)을 임신한 랫트에게 투여하면 정액과 생식기사이의 거리가 같은 암수 컷 차신자가 생산되었다. 이러한 효과들이 수컷 랫트에게 무도도는 시기는 임신 16~17일 사이인 것으로 밝혀졌다. 위의 변화들은 type II 5α-환원효소 억제제 계열에 속한 물질들의 약리학적 효과로, 선택적으로 type II 5α-환원효소가 결합된 남성외이에서 보고된 바와 유사하다. 차군대에서 이 약의 다양한 용량에 노출된 적의 있는 암컷 차신자에서는 비정상적 소견이 발견되지 않았다.
3) 이 약을 투여한 후 혈중농도(80mg/kg/일, 사람에서의 상용량의 488배)와 이 약을 투여한 다른 암컷 랫트를 교미시켜 생산된 체 1세대 수컷 및 암컷 차신자에서는 발생상의 비정상적 소견이 관찰되지 않았다. 임신후기 및 수유기동안 3mg/kg/일의 용량(사람에서의 상용량의 150배)을 투여시에는 제 1세대 수컷 차신자의 수태능이 경미하게 감소하였으나, 암컷 차신자에는 이무런 영향이 없었다. 임신 6~18일 사이에 자궁 내에서 이 약의 100mg/kg/일의 용량(사람에서의 상용량의 5000 배)에 노출된 토끼의 태자에서는 최기형의 증가를 발견할 수 없었다. 그러나 이 시험에서는 생식계 발생시기동안 이 약에 노출되지 않았으므로 수컷 생식기에 대한 영향을 기대할 수 없었다.
4) 배자 및 태자 발생시기동안 지정 내에서 이 약에 노출되었을 때의 효과는 랫트나 토끼에 비해 사람의 발생시기동안 생식계 영향을 더 잘 예측할 수 있게 해주는 동물모델인 리스사 원숭이에서 평가되었다(임신 20~100 일). 임신한 원숭이에게 800ng/일의 용량(1mg/일의 용량을 복용하는 남성의 정액으로부터 예상에게 노출될 수 있는 이 약 희석 용량의 250배이상)을 정맥투여했을 때 수컷 태자에서의 비정상적 소견은 관찰되지 않았다. 사람 태아의 발생 과정에서의 영향을 예측하기 위해 원숭이 모델을 사용하는 것이 적절한지를 확인하기 위하여 이 약 2mg/kg/일을 임신한 원숭이에게 경구투여 했을 때, 수컷 태자 외부생식기에서의 비정상적 소견이 관찰되었다. 수컷 태자에서의 다른 이상은 발견되지 않았으며, 암컷 태자에서는 어떤 투여 용량에서도 이 약과 관련된 이상은 관찰되지 않았다.

8. 수유부에 대한 투여
이 약을 여성에게 투여하여서는 안된다. 이 약이 유즙으로 분비되는지 여부는 알려져 있지 않다.

9. 소아에 대한 투여
이 약을 소아 환자에게 투여하여서는 안된다. 소아에서의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다.

10. 고령자에 대한 투여
이 약은 65세 이상의 환자를 대상으로 유효성에 대한 임상연구를 실시하지 않았다. 이 약 5mg을 투여한 한 약동학적자료를 근거할 때 이 약을 고령자에게 투여시 용량조절이 필요하지 않다. 그러나, 이 약은 고령자에 대한 유효성이 확립되어 있지 않다.

11. 임상검사치에의 영향
18~41세 환자를 대상으로 하여 실시한 이 약의 임상시험에서 혈청내 전립샘 특이 항원(PSA)의 평균값이 0.7ng/mL에 12개월째에는 0.5ng/mL로 감소되었다. 이 약을 전립샘비대증을 가진 고령자에게 사용할 때에는 PSA 수치가 약 50% 감소한 반 있다. 이 약을 복용하고 있는 동안 PSA 수치를 검사한 경우에는 그 결과수치를 적절히게 해석하는 것을 고려하여야 한다.

12. 과량투여시의 처치
임상시험에서 이 약 400mg을 1회 복용하거나 80mg/일의 용량으로 3개월간 복용한 경우에도 이상반응은 보고되지 않았다. 추가정보가 필요시 제조사의 지시사항 이 약 과량복용시에 돌아한 처치요법은 확립되어 있지 않다. 수컷 및 암컷 마우스에 1,500mg/m2(2500mg/kg)의 용량으로 1회 경구투여하거나 랫트 및 수컷 랫트에 2,360mg/m2(400mg/kg), 5,900mg/m2(1000mg/kg)을 각각 1회 경구투여한 경우에는 유의한 치사율이 관찰되었다.

13. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣은 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

14. 기타
1) 발암성수컷 쥐트에게 160mg/kg/일, 암컷 랫트에게 320mg/kg/일까지 24개월간 투여하였을 때 종양원성을 나타내지 않았다. 이 용량은 사람 권장용량인 이 약 1mg/일을 투여한 남성의 전신노출량의 각각 888배와 2 192배에 해당한다. 간-1 마우스를 이용한 19개월간 발암원성 연구에서 250mg/kg/일의 용량(사람노출량의 1,824배에서 통계학적으로 유의한 수준(α≤0.05)의 고환의 leydig-cell(간질성 세포종의 증가기 관찰되었다. 25mg/kg/일의 용량(사람 노출량의 184배)을 투여한 마우스와 40mg/kg/일의 용량(사람노출량의 312배)을 투여한 햇트에서 레이디 세포의 증식이 할정 나 수치 상승(유의한 군보다 2~3배이 확인되었다.
2) 생체외 박테리아 돌연변이 시험포유류 돌연변이 시험 또는 생체외 일차적 염색체 이상시험에서 변이원성이 관찰되지 않았다. 생체외 염색체 이상시험에서 이 약의 고농도(450~550μmol)를 Chinese hamster ovary cell에 투여하였을 때 염색체 이상이 약간 증가하였다.
3) 수태능 손상정도를 알아보기 위한 수컷랫트에게 이 약 80mg/kg/일(사람 노출량의 488배)를 6주 또는 12주 후에 암컷쥐에 대하여 유의한 영향을 미치지 않았으나, 24주 또는 30주까지 처치 투여하였을 때 생식능과 수정능의 확실한 감소의 징후가 전립샘 무게의 유의성 있는 감소가 관찰되었다. 이러한 모든 변화는 투여중단 6주 내에 가역적으로 회복되었다. 이 약을 투여한 랫트에서 생식기능의 감소는 부속 성기관들(전립샘 정낭에 대한 효과로 정액조(seminal plug)을 형성하지 못하여 생성되는 2차적인 결과이다. 정액전단 랫트의 정상적 수태능에 필수적 요소이며 사람의 관련되어 있지 않다.

【보장단위】 30정(10장/PTP×3)

【저장방법】 일패용기, 습기를 피하여 15~30℃ 보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조의뢰자】 동림바이오제약주) / 경상남도 창원시 마산합포구 가포신항안길로 9

【제조자】 영일제약(주) / 충청북도 진천군 진천읍 문화2길 6-1

【판매자】 (주)온오파마 / 서울특별시 영등포구 선유로 9 유니온빌딩 411호

지원 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 특히 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 · 훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※ 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)을 방문하시면 첨부문서 작성 (개정일 이후의 최신 제품정보를 확인하실 수 있습니다. 제품문의 및 상담은 전화031-8015-0363)로 문의바랍니다.

개정년월일 : 2021년 03월 16일
20190544O | 210316

제조의뢰자 동림바이오제약(주)
제조자 영일제약(주)
판매자 (주)라온파마