

복용전에 이 설명서를 꼭 읽어 주세요. 또한 필요한 때에 읽을 수 있도록 보관해 주세요.

이치원 캡슐 청위산

일반의약품

【제품명】 이치원캡슐(청위산)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 (520mg) 중

■ 유효성분

승 마(KP)	1,250mg	황 련(KP)	630mg
목 단 피(KP)	940mg	생 지 황(생규)	630mg
당 귀(KP)	630mg		이상물건조엑스 375.36mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소 우유)

■ 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호, 황색4호

■ 기타첨가제 : 옥수수전분, 콜로이드성이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 캡슐, 스테아르산마그네슘

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상부 옅은 회적색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】 위열(胃熱)에 의한 치통

【포장단위】 20캡슐(10캡슐/PTP X 2)

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관, 제조일로부터 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 엄증성 열이 있는 환자
- 2) 몸에 열이 있는 환자
- 3) 물이 허약하여 마른 기침을 하는 환자
- 4) 비위가 허약하고 장이나 위에 적체가 있는 환자
- 5) 신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 황련, 목단피에 의해 유·조산(조기분만)의 위험성이 있다.)
- 6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고령자(노인) 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 4) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 5) 이전에 간질환 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위험이 있었던 환자
- 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등
(2) 간질환으로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 뇨 등)

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
- 3) 1주 이상 계속하여 복용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래의 용기에서 끌어내 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 설명서 개정년월일 : 2020.01.20 | 2001-01



인천광역시 남동구 남동대로 394

소비자 상담실 : 1599-7199

www.kbpharm.com

※ 자세한 사항은 식품의약품 안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.