



헤모데이 캡슐

(폴리사카리드철착염)

새로운 성분의 빈혈 예방 치료제

HemoDay Capsules

■ 원료약품 및 분량 : 1캡슐 중

■ 유효성분 : 폴리사카리드철착염(KP) 326.1mg
(철(Fe)로서 150mg)

■ 첨가제(다른색소) : 적색 40호, 청색 1호

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소,우유)

■ 기타 첨가제 : 상, 하부 적색의 경질캡슐, 스테아르산마그네슘, 탤크

■ 성상

透明胶囊에서 짙은 갈색의 분말이 총전된 상 · 하부 적색의 경질 캡슐제

■ 효능 · 효과

철 결핍성 빈혈

■ 용법 · 용량

성인 : 철로서 1일 1회 150mg을 복용합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락합니다.

2. 투여 환자는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자

2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)

3) 혈색소증(철 대사이상으로 철이 간장, 체장(간장)에 침착하는 질환), 헤모시데리침착증

(조직 장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데리으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
4) 철 이용장애 (예: 낮중독으로 인한 빈혈, 철 불용성(늦지않는) 빈혈, 지중해 빈혈, 만발성 피부 포르피린증) 환자

5) 비철결핍성 빈혈 환자 (예: 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 거대적야구성 빈혈)

6) 골수(뼈속질) 부족에 의한 빈혈 환자

7) 만성 청혈성 빈혈 환자

8) 철 과잉증 환자

9) 강염이나 종양으로 인한 철 결핍성 빈혈 환자 (철이 세망 내피계에 축적되어 이용에 장애를 받을 수 있으므로 1차 질환
이 치료된 후 복용하십시오.)

10) 만성 체장(이자)염 환자

11) 간경변 환자

12) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증
(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인
문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

1) 인산염, 칼슘염

2) 경구용 테트라사이클린계 항생제

3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 흑차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용전후에는 피하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

일반의약품
분류번호: 322

3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

4) 발작성 악기 혈색소뇨증 환자 (옹혈을 유발하여 병태를 악화시킬 수 있습니다.)

5) 신경(경골)에 환자

6) 저단백혈증 환자

7) 철 함유제제(철제, MRI용 강장 조영제 등)를 투여중인 환자

8) 항암도스테론제, 트리암데린과 함께 복용하는 사람 (고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)

9) 퀴놀론계, 페니실리민, 콜레스티리민, 퀘장엑스 및 비타민 E와 같은 물질을 복용하는 사람

10) 철분 제제와 디포스폰산 염류, 티록신, 세프디니르 제제를 동시 복용하는 사람

(이 제제들의 흡수가 감소되므로 일정한 시간 간격(2~3시간 이상)을 두고 복용하십시오.)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당시 가능한 이 첨부문서를 소지
하십시오.

1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응

2) 복부 위통증, 위 경련

3) 구토, 설사

4) 열, 흰수

5) 때때로 AST, ALT의 상승, 드물게 ALP 상승

6) 구역, 식욕부진, 변비, 흐鲆(검개변형), 치아변색, 위부불쾌감

7) 과량투여로 인해 구역, 구토, 변비, 설사 등의 위장증상, 식욕부진, 복통, 토흘(혈액구토), 직장(곧창자)출혈, 무기력,
순환장애 또는 과열당증, 대사성 산증, 간 혈소 수치의 상승, 색소침착, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 권태감, 부종(부
기), 증독 될 경우 소화기관의 혐착 유발

8) 과량투여로 인한 위장관 경애와 순환 부전을 수반한 허탈의 경우에는 구토를 시킨 후 탄산염과 우유를 복용시켜 위세
척을 하십시오.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

2) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 철액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생
할 수 있으므로, 가능한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다. (예: 만성질환에 의한 빈혈은 철분 복용이 유효하지
않습니다.)

3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

4) 투여 중에는 혈액 검사를 실시하고, 과량 투여하지 않도록 주의하십시오.

5) 아스코르бин산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용할 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 수 있으며 습기나 적고 서늘한 곳에 일전(두경을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.

3) 오용(잘못사용) · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ 저장방법

기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

■ 사용기간

제조일로부터 36개월

■ 포장단위

30캡슐/병, 500캡슐/병

■ 제조의뢰자

(주)시어스제약 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로22, 3층일부(070-8822-7755)

■ 제조자

(주)동구바이오제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 18

※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.

※ 본 의약품은 「우수의약품제조관리기준 (KGMP)」에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경
과되었거나 변질, 변매, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.

※ 사용(유료)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통해 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

(주)시어스제약

작성일자: 2020.06.11.(00)