

간편한 1일 2회 복용 소염효소제

브롤라인 장용정

(브로멜라인)

일반의약품

Brolain Enteric Coated Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 브로멜라인(별규).....100mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크, 황색5호 알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스102, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스보덴, 탭실드분홍색(39P407), 탭실드흰색(11W401)

【성상】

분홍색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

부종(부기)을 동반한 염증 증상의 완화, 외상(상처) 또는 수술 후의 부종(부기)

【용법·용량】

- 성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다.
- 체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
- 2) 심한 간 또는 심한 신질환(신장질환) 환자(혈액투석환자 등)
- 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
- 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 5) 12세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.)
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부분서를 소지할 것.

- 1) 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 지연적으로 빠르게 소실된다.
- 2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(질량사용) 에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 25℃이하 보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 300정/병

※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효) 기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 작성일자(2022년 09월 22일) 이후 변경된 내용은 대화제약(주) 홈페이지나 고객센터전화(080-856-0114)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물관리센터(1644-8223)에 자발적인 부작용 보고 및 피해구제를 문의할 수 있습니다.

최초 작성일 : 2022년 09월 22일



제조의뢰 및 판매자

대화제약주식회사

서울특별시 서초구 남부순환로 2145
공정·강원도 황성군 황성읍 한우로 495
<http://www.dhpharm.co.kr>



제조사

(주)마더스제약

MOTHER'S PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
전라북도 익산시 삼기면 신안로동길 38 제2공장