



활성신경비타민과 항산화제를 함유한 근육경련 및 혈액순환 개선제
마그로민 골드프리미엄 연질캡슐
 마그네슘(Magnesium) + 비타민(Vitamin)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

산화마그네슘(마그네슘으로서 150.8mg(KP))	250 mg
토코페롤아세테이트(비타민E로서 500IU)(KP)	500 mg
푸르셀티아민(KP)	50 mg
피리독신염산염(KP)	50 mg
시아노코발라민(KP)	0.5 mg
γ-오리자놀(KP)	5 mg

첨가제(동물유래) : 젤라틴(소, 가축내피)

첨가제(기타) : 농글리세린, 레시틴, 백납, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 적색산화철, 콩기름, 폴리소르베이트80

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민E, B1, B6의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기 - 노년기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염·각기·눈의 피로

2. 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

【성상】 연한 분홍색의 점조성 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젓먹이
- (3) 심한 증상의 신부전 환자
- (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 만 1세 미만의 젓먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 심장·순환기계기능 장애 환자 (5) 신장(콩팥)장애 환자 (6) 저단백혈증 환자 (7) 임부
- (8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy:말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B12를 1일 10μg이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용 투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것(무기질 함유제제).
- (8) 우발적으로 과량 복용한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.
- (4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 케이스 별도 표시일 참조

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【소비자상담실】 02-2210-8169

【판매원】 광동생활건강(주) / 서울특별시 서초구 서초중앙로 85

【제조사】 **서용** (주)서흥 / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

※ 의약품의 용어설명, 의약품 허가 변경사항 등 기타 자세한 의약품 정보는 식약처 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)