

타치온[®] 주사(바이알) 100mg

글루타티온(환원형)

전문약품



소비자중심경영 인증

Tathion[®] for injection(vial) 100mg

(Glutathione(Reduced))

[제품명] 타치온주사(바이알)[글루타티온(환원형)]

[원료약품 및 분량] 1 바이알 중

· 유효성분 : 글루타티온(환원형)(KP) 100mg
· 첨가제(안정제) : 탄산수소나트륨 적량

[성상] 흰색의 다공성 고체가 든 무색투명한 바이알

[효능·효과]

1. 약물중독, 알코올중독
2. 만성 간질환에서의 간기능의 개선

[용법·용량]

글루타티온으로서 1일 1회 100~200mg을 주사용수에 용해시켜 근육 또는 정맥주사 합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 이상반응
 - 1) 아나필락시양 증상 : 드물게 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면창백, 혈압저하, 맥박이상 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 2) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다.
 - 3) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통이 나타날 수 있습니다.
2. 적용상의 주의
 - 1) 조제시 : 용해 후 즉시 사용합니다.
 - 2) 근육주사하는 경우에는 신경 및 혈관을 피하여 신중히 투여합니다. 또, 반복투여의 필요성이 있는 경우에는 좌우를 바꾸어 주사하는 등 동일부위를 피하고 유·소아에는 특히 주의합니다.

3. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

[저장방법] 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 10바이알

[최신정보 확인방법]

최신의 품목허가 또는 신고사항은 식약처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

[문의전화] 고객센터 : 080-920-1001

※ 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한 국의약품안전관리원 (1644-6223)으로 문의 및 보고 하여 주시기 바랍니다.

Ⓜ 등록상표

- ※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염·손상된 의약품을 구입하였을 때에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

TTO100V-7M001

첨부문서 작성 : 2017. 12



東亞ST



동아에스티

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단로 200-23 (2B, 3, 4B층)