

동아 **니세틸® 정**  
(아세틸-L-카르니틴염산염)  
**DONG-A NICETILE® Tab.**  
(Acetyl-L-carnitine hydrochloride)

전문의약품



[원료약품 및 분량] 이 약 1정(735mg) 중  
유효성분 : 아세틸-L-카르니틴염산염(KP) ..... 590mg  
(아세틸-L-카르니틴으로서 500mg)  
첨가제 : 디메티콘, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 셀라세페이트, 스테아  
르산마그네슘, 포비돈, 프탈산디에틸

[성상] 이 약은 흰색의 장방형인 장용성 필름코팅정입니다.

[효능 · 효과]

뇌혈관 질환에 의한 이차적 퇴행성 질환

[용법 · 용량]

아세틸-L-카르니틴으로서 1회 500 mg을 1일 2 ~ 3회 경구투여합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약에 대해 과민반응을 나타내는 환자

2. 이상반응

이 약의 복용 시 드물게 흉본작용이 나타나는 경우가 있으나 체내의 약용량이 감소함에 따라 이런 증상은 바로 소실됩니다.

이 약을 복용한 환자에게서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었습니다.

이 약을 복용한 요독증 환자에게서 경증의 근무력증이 보고되었습니다.

3. 상호작용

다른 약물과의 상호작용은 없는 것으로 알려져 있습니다.

4. 임부 및 수유부 등에 대한 투여

동물실험에서의 태아독성은 보고된 적이 없지만 임신 초기 3개월 기간과 수유기의 여성은 꼭 필요한 경우 예만 의사와 감독 하에서 복용하도록 하십시오.

※ 국내임상시험결과 추가 제출.

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30°C) 보관

[주의사항]

본 제품은 흡습성이 있으므로 PTP 포장 상태로 조제하여 주십시오.

[포장단위]

60정(10정/PTP X6)

[최신정보 확인방법]

최신의 품목허가 또는 신고사항은 홈페이지  
(<http://www.donga-st.com>)에서 확인하실 수 있습니다.

[문의전화] 고객만족팀 : 080-920-1001

※ 본 약제 투약 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관  
리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시기 바랍니다.

⑧ 등록상표

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

※ 사용(유통)기한이 지났거나 변질·변패·오염·손상된 의약품을 구입하였을 때에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

NCT-9G030  
첨부문서 작성 : 1994.06  
첨부문서 개정 : 2019.07.03

제조판매원

東亞ST 동아에스티

분사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23 (2B, 3, 4B층)

기술제휴선

ALFASIGMA