

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.



일반의약품
분류번호 233
KGMP 적격업체

스피자임정 소화불량 · 과식 · 체함 · 위부팽만감

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 :

판크레아틴(USP) 175.0mg

(전분당화력 41,6667단위 이상, 단백소화력 250단위 이상, 지방소화력 16,6667단위 이상),

(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 혀장(이지))

셀룰라제(별규) 50.0mg

(125셀룰라제 단위)

디메티콘(NF) 25.0mg

우담즙건조엑스(생규) 25.0mg

(콜린산으로서 11.3mg), (기원동물 : 소, 사용부위 : 쓸개)

■ 첨가제(타르색소) : 황색 203호, 청색 1호

■ 동물유래 : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 기타 첨가제 : 글로이드성이산화규소, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 디아세틸레이티드모노글리세리드, 산화티탄, 히프로엘로오스프탈레이트, 황색 203호 알루미늄레이크, 청색 1호 알루미늄레이크

[성상]

초록색의 장방형 장용필름코팅정

[효능 · 효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법 · 용량]

만 15세 이상 : 1회 2정 1일 3회 식후에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 만 7세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 이 첨부문서를 소지하십시오.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위]

10정, 100정, 200정

[취급상의 주의사항]

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 개정일자(2019년 02월 07일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 소비자 상담실 (02)561-4011

※ 부작용 보고 : 한국의약품 안전관리원(1644-6223)

[제조자]

에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두마리길 16

[판매자]

(주)대웅생명과학 / 서울특별시 송파구 삼전로 42