효과빠른 종합소화제

KGMP적격업체

일 반 의 약 품

분류번호:233

페타론 정

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【성분 • 함량】 1정 중

· 유효성분 : 판크레아틴(KP) ---------- 175.0mg　　우담즙엑스(생규) ---------- 25.0mg

디메티콘(NF) ---------- 25.0mg　　헤미셀룰라제(KP) ---------- 50.0mg

· 첨가제(타르색소) : 황색203호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크, 청색2호 알루미늄레이크

· 첨가제(동물유래성분) : 우담즙엑스(기원 : 소, 사용부위 : 우담즙), 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)

· 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴이즈녹색(93O41049), 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 탤크, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 연녹색의 장방형 장용성 필름코팅정제

【효능 • 효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법 • 용량】 성인 1회 1～2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것

1) 만 7세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람(전분소화효소, 단백소화효소, 지방소화효소, 또는 섬유소소화효소 함유 제제)

2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선(햇볕)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

Arlico 알리코제약(주)
충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

개정연월일 : 2017. 12. 18
01/201712