

한국인의 두통약

게보린® 정

두통·치통·생리통·오한·발열

Geworin® Tablet

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

유효성분 : 아세트아미노펜(KP).....300mg
 이소프로필안티피린(KP).....150mg
 카페인무수물(KP).....50mg
 첨가제(타르색소) : 적색3호
 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 실리콜디옥사이드, 저치환도이드로스프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성상 : 홍색의 정제

■ 효능·효과 : 다음 질환의 진통 및 해열시 단기 치료 :
 - 두통, 치통, 발치(이를 뽑은)후 통증(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(어깨통증), 타박통, 골절통, 염좌통(뺨 통증), 월경통(생리통), 외상(상처)등의 진통
 - 오한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열

■ 용법·용량

성인 1회 1정 1일 3회까지 공복(빈속)시를 피하여 복용한다.
 복용간격은 4시간 이상으로 한다.
 이 약은 원칙적으로 단기 복용한다.
 15세 미만의 소아는 이 약을 복용하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응(예, 발진, 발적(종혈)되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)후두, 눈꺼풀, 입술 등) 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제(비스테로이드소염(항염)진통제(NSAID)), 감기약 복용시 천식발작 유발 또는 그 병력이 있는 사람
- 3) 글루코스-6-인산 탈수소 효소 결핍증 환자
- 4) 급성 간헐성(시간 간격을 두고 되풀이하여) 포르피린증 환자
- 5) 과립백혈구감소증(granulocytopenia) 환자
- 6) 중증(심한 증상) 간장애 또는 중증(심한 증상) 신장애(신장장애) 환자
- 7) 출혈 소인이 있거나 소화 기관에 궤양이 있는 환자
- 8) 15세 미만의 소아
- 9) 심한 혈액 이상 환자
- 10) 심한 심장기능저하 환자
- 11) 다음의 약물을 복용한 환자 : 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제

KGMP적격업체 | 일반의약품

안전용기·포장

(9) 과량투여 : 간장, 신장(콩팥), 심근의 과사
 3) 아세트아미노펜 단일제에 대해 시판 후 조사에서 보고된 추가적 이상반응은 아래 표와 같다. 발현빈도는 매우 흔하게 $\geq 1/10$, 흔하게 $\geq 1/100$ 이고 $< 1/10$, 흔하지 않게 $\geq 1/1,000$ 이고 $< 1/100$, 드물게 $\geq 1/10,000$ 이고 $< 1/1,000$, 매우 드물게 $< 1/10,000$ 이다. 표, 자발적 보고율로부터 추정된 빈도에 따른 아세트아미노펜 단일제의 시판후 경험에서 밝혀진 이상반응

면역계	매우 드물게 : 아나필락시스 반응, 과민반응
피부 및 피하(피부밑)조직	매우 드물게 : 두드러기, 가려움 발진, 발진

4) 아세트아미노펜 단일제 국내 이상반응 보고자료의 분석·평가에 따라 다음의 이상반응을 추가한다.
 (1) 간담도계 : AST 상승, ALT 상승
 (2) 피부 : 고정(固定)발진

6. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

1) 일반적주의

- (1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이다.
- (2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 ① 장기복용하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 받고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 복용 중지 등의 적절한 조치를 해야 한다.
 ② 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
- (3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 ① 급성통증 및 발열의 정도를 고려하여 복용한다.
 ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기복용은 피한다.
 ③ 원인요법이 있는 경우에는 실시한다.
- (4) 소아 및 고령자(노인)는 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의한다. 과도한 체온강하, 허탈, 사지냉각 등이 나타날 수 있으므로 특히 고열을 수반하는 소아 및 고령자(노인) 또는 소모성 질환 환자의 경우, 복용 후의 상태를 충분히 살펴야 한다.
- (5) 다른 소염(항염)진통제와 함께 복용하는 것은 피한다.
- (6) 의사 또는 약사의 지시없이 통증에 10일 이상(성인)또는 5일 이상(소아) 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 않는다. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화될 경우, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의 한다.
- (7) 이 약 복용시 감염증을 겹으로 나타나지 않게 할 수 있으므로 감염증이 합병된 환자의 경우에 의사처방에 따라 적절한 항균제를 함께 복용해야 한다.

2) 상호작용

바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

3) 과량투여시의 처치

이 약을 과량복용시 어떠한 명백한 증상이나 징후가 없더라도 신속하게 의학적 처치를 받아야 한다. 10~12시간 이내에 N-아세틸시스테인 정맥주사를 투여받거나 메티오닌을 경구복용하여 간을 보호해야 한다.

7. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 오용에 따른 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 10정

* 게보린®정은 어린이의 약물사고를 방지하기 위하여 "어린이 보호 안전포장" 을 하였습니다. 복용전 아래 개봉방법을 꼭 읽으십시오.

* 개봉방법



포장 앞면을 강하게 눌러 약을 꺼냅니다.

* 주의

1. 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
2. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
3. 이 제품의 포장은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 포장(hard push)을 사용하여 약의 잘못 사용, 남용 및 어린이 약물 중독을 예방하고 있습니다.
4. PTP 포장을 개봉하여 복용시 가끔 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용하시기 바랍니다.
5. 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

* 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

* 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

* 본 첨부문서 문안 개정일자(2020년 02월 07일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

02020

GWTP-03-05-0108

제조판매원

SAMJIN 삼진제약주식회사

본사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031)353-1712/6