

031319

파자임[®] 95mg 이중정 **필름코팅정**

파자임[®] 95mg 이중정은 시메티콘(Simethicone) 및 판크레아틴(Pancreatin)을 함유하고 있으며, 이들 성분이 인체내에서 약리학적 활성을 효율적으로 발휘하도록 고안된 제형인 라미네이트코팅정(Laminated Coating Tablet)으로 되어 있습니다. 파자임[®] 95mg 이중정은 효소의 역가를 보존하면서 위와 장에서 단계적으로 작용하도록 제조된 가스제거 소화제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 :

-장용부

판크레아틴(USP) 40.0mg
(동물유래성분, 사용동물: 돼지, 사용부위: 췌장) 프로테아제 6000USP단위, 리파제 480USP단위, 아밀라제 4000USP단위
시메티콘(USP) 70.0mg

-위용부

시메티콘(USP) 25.0mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 젖), 정제셀락(기원동물: 개각충, 사용부위: 분비물)

기타 첨가제 : 글리세린지방산에스테르, 미결정셀룰로오스, 이라비아고무, 오파그로스2클리어97W19196, 전산화전분, 크로스포비돈, 탈칼드 갈색(98206), 폴리옥실 40 스테아레이트, 히프르멜로오스포탈레이트

【성상】 적갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체한, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 가스제거

【용법·용량】 성인 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 소아

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【포장단위】 10정/PTP, 20정(10정/PTP×2), 500정(10정/PTP×50), 100정/병, 500정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품이상사례보고에 알려도록 하십시오.

※ 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

제조·판매

부광약품주식회사

경기도 안산시 단원구 농안로 47

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 지희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 통화료를 부담하는 소비자 상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

◆ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233 <http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2019년 03월 13일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.