

소화안되는 **그날엔** 속엔쿨 정



소화불량



복부팽만



과식



체함

【성분·함량】1정 중

판크레아틴 I (KQ)	175mg
우담즙엑스(생규)	25mg
메티티콘(NF)	25mg
헤미셀룰라제(KP)	50mg
첨가제(타르색소 알루미늄레이크) : 청색1호, 황색203호	

【성상】 연녹색의 장방형 작용성 필름코팅정제

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 2) 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10정

※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지난거나 유통과정 중 변질, 변태 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하시기 바랍니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국 의약품안전관리원(drugsafe.or.kr→의약품유해사례보고)에 알리시기 바랍니다.

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의사사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

“이 첨부문서 개정일(15년 2월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121, 3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.”

제조외뢰 · 판매처 : 경동제약(주)

경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

제조원 : 알리코제약(주)

충북 진천군 광혜원면 용소2길 21

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121, 3



경동제약주식회사

· 작성년월 : 2015. 02

· 개정년월 : 2015. 02

· 개정번호 : 1503A