

태준 리도카인 비스코스 2%액

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
적용부위에 점막의 외상 환자

3. 이상반응

- 1) 속 : 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 협일저하, 안면창백, 맥박의 이상, 호흡억제 등이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 중추신경계
 - ① 진전, 경련 등의 중독한 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 디아제팜 또는 초단시간형 바르비탈산 제제(치오펜탈나트륨) 투여 등 적절한 처치를 하십시오.
 - ② 졸음, 불안, 흥분, 무시, 어지러움, 구역·구토, 경미한 두통, 신경과민, 다행증, 착란, 이명, 열감, 냉감, 무감각, 연축, 무의식, 호흡억제, 호흡정지 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 속 또는 중독한 증상으로 이행하는 것에 주의하고 필요에 따라 적절한 처치를 하십시오.
- 3) 심혈관계 : 서맥, 저혈압, 순환허탈이 나타날 수 있으며 심정지로 이행될 수 있습니다.
- 4) 피부 : 피부조작장애, 두드러기, 부종, 아나필락시양 반응, 알러지 반응이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 드물게 속 또는 중독한 증상이 나타날 수 있으므로 국소마취제 사용시에는 즉시 구급처치를 할 수 있도록 준비해두는 것이 바람직합니다.
- 2) 이상반응을 완전히 방지할 수 있는 방법은 없으므로 속 또는 중독한 증상을 피할 수 있도록 다음에 유의하십시오.
 - ① 환자의 전신상태를 충분히 관찰합니다.
 - ② 가능한 한 필요최소량을 투여합니다.
 - ③ 국소마취제를 구인두에 적용하는 경우, 연하작용을 저해하여 흡인의 위험이 증가되므로 주의하며 이 약 투여후 60분 동안은 음식물을 섭취하지 않습니다. 이것은 소아의 경우 음식물을 자주 먹게 되므로 특히 중요합니다.
 - ④ 혀 또는 구강 점막의 마비는 자작에 의한 외상의 위험성을 증가시킬 수 있으므로 주의하십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 이 약의 모유중으로의 이행 여부에 대하여 알려져 있지 않으나, 수유부에 투여하는 경우에는 주의하십시오.

6. 적용상의 주의

이 약을 사용하기 전에 잘 흔들어서 사용하십시오.

7. 기타

동물실험에서 발암성이 있는 것으로 나타난 사카린을 함유하고 있어 건강에 해로울 수 있습니다. (감미제로서 사카린이 함유되어 있습니다.)

- 저장방법 : 기밀용기, 실온보관 (15~30℃)
- 포장단위 : 15mL

※ **사용기한·제조번호는 제품의 밑면을 확인해주시시오.**

■ 원료약품 및 그 분량(100mL 중)

주성분 : 리도카인염산수화물(USP) ······ 2.13g
(리도카인염산염으로서 2.0g)

보존제 : 파라옥시벤조산프로필 ······ 0.03g
파라옥시벤조산메틸 ······ 0.07g

■ 성상 : 옅은 미색의 투명한 농후액

■ 효능·효과 :

1. 이비인후과 영역 : 구강·인두 점막의 자극, 염증시 국소마취
2. 치과 영역 : X-선 촬영 또는 치과 인상 (dental impressions) 시의 구역 억제

■ 용법·용량

성인 : 건강한 성인에 대한 추천 1회 최대용량은 리도카인염산염으로서 체중 kg당 4.5mg을 초과하지 않으며 어떠한 경우에도 총 투여량은 리도카인염산염으로서 300mg (이 약으로서 15mL)을 초과하지 않습니다. 구강·인두 점막의 자극, 염증시의 대증요법으로는 리도카인염산염으로서 300mg(이 약으로서 15mL)을 투여합니다. 구강 사용시에는 이 약을 머금은 후 뱉으며 인후 사용시에는 이 약을 머금은 후 연하시킬 수 있습니다. 3시간 이내에 재사용하지 않으며 24시간 이내에 8회 이상 사용하지 않습니다. 연령, 마취영역, 부위, 조직, 중상, 체질, 전신상태에 따라 적절히 증감 하십시오.

※ 약품을 사용하기 전에 설명문안을 주의 깊게 읽어와 하며, 설명문안을 꼭 약품과 함께 보관하십시오.

※ 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 약약품 용어설명 및 기타 자세한 약약품정보는 온라인 의약품사전 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 설명문안에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원 (www.drugsafe.or.kr) → 약약품유해사례보고에 알려주시시오.

※ 소비자 문의 : (주) 태준제약 CS팀 (02)799-0271

※ 이 설명문안의 작성년월일은 1998년 09월 30일이며, 개정년월일은 2014년 10월 02일입니다. 개정년월일 이후 변경된 내용은 태준제약 홈페이지 (www.taejoon.co.kr)나 전화번호 [(02)799-0271] 에서 확인할 수 있습니다.

※ 작성년월일, 개정년월일은 제품의 사용기한과는 무관합니다.

※ **사용기한·제조번호는 제품의 밑면을 확인해주시시오.**

제조판매원



본사 : 서울특별시 용산구 대사관로 31길 8
공장 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 109-30