

일반의약품 **조제용** 「분류번호 : 234」

알게마정

500 (알마게이트)

【원료약품 및 그 분량】 1정(532.85mg) 중

유효성분 : 알마게이트(별규) 500.0mg

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘,

전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소

【성상】 백색의 정방형 정제

【효능·효과】

다음 질환의 증상완화 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
- 2) 알츠하이머병 환자

- 3) 치질 환자
- 4) 체액 저류(부기) 환자
- 5) 임신 중독증 환자
- 6) 설사 환자
- 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수율 억제할 수 있음)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와상의할 것.

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.

(1) 비스테로이드소염진통제(NSAID), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수율을 감소시킬 수 있으므로 2~3시간 간격을 두고 복용한다.

(2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다.

- 2) 신장에 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 콩팥에 축적될 수 있다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.
- 3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄이온이 인 흡수율을 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.

4) 고령자

5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와상의 할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
- 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【포장단위】 500정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【제조자】 한국코러스(주) 충청북도 제천시 강저로 30

【제조회사 및 판매】 (주)유영제약 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33

이 약을 사용하기 전에 반드시 라벨을 주의 깊게 읽어야 합니다.

본 표시자재의 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처

온라인도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지

(www.yypharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원

(1644-6223)으로 문의바랍니다.

개정년월일 : 2017. 10. 25



환경친화적 포장재

환경친화적 포장재

환경친화적 포장재

LP0141710

제조번호:

사용기한:

50*20