



눈의피로 눈 영양제 눈모아 연질캡슐

- 눈의 건조감
- 책을 많이 봐야 하는 발육기, 청소년
- 장기간의 컴퓨터 사용자 및 운전자
- 밤눈이 어두운 야맹증
- 눈이 쉽게 피로하고 뻑뻑하신 분



체내에 비타민 A가 결핍되면 눈 조직 세포들이 노화되어 안구조적이 탄력성을 잃게 되어 눈이 건조해지게 됩니다. 눈모아 연질캡슐은 비타민A를 함유하고 있어서 안구의 탄력성을 정상으로 유지시켜주는 윤활제와 같은 역할을 함으로써 눈의 건조감 및 이를 수반하는 각종 연화증을 개선해 줍니다.

눈모아 연질캡슐은 망막에서의 Rhodopsin재생능력을 촉진시켜 광 감수성을 높여주고, 어둠속에서 시력회복을 증진시켜 야맹증을 예방, 치료해줍니다.

또한, 눈모아 연질캡슐은 비타민 A, D, 인체에 필요한 필수지방산의 총체인 사육 및 동물 로로필을 주성분으로 하고 있어 시력개선 및 뼈, 치아의 발육을 촉진시켜 줍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(660mg) 중

• 유효성분 : 사육(생규)	296.70mg
레티놀팔미테이트유(KP)	2.00mg
(비타민A로서 2,000 IU)	
에르고칼시페롤과립(별규)	0.235mg
(비타민D로서 200 IU)	
동물로로필(별규)	0.30mg

- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색203호
- 첨가제(동물유래) : 백남기원 : 벌, 사용부위 : 분비물, 젤라틴(기원 : 소, 사용부위 : 가죽)
- 유효성분(동물유래) : 사육(기원 : 뱀, 사용부위 : 장간막내 지방층)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸비닐린, 중쇄트리글리세리드, 카르나우바남, 키키름

[성상] 연한 녹황색의 점조성 내용물이 든 알갈색의 타원형 연질캡슐
 [효능·효과] 1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조함 2. 치골의 발육불량 3. 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) 4. 구루병 예방 5. 다음 경우의 비타민 A, D의 보급 : 임신수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하시, 발육기, 노년기
 [용법·용량] 15세 이상 성인 : 1일 1회, 2캡슐
 7세 이상~15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고
 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.
 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 : 피부(가려움), 소화기(오심(구역), 구토)
 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000IU 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있다.)
 3) 고지혈증, 당뇨병성고지혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. : 설사
- 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항.
 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경우용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관할 것.
 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

[포장단위] 100캡슐(10캡슐/PTP x 10), 200캡슐(10캡슐/PTP x 20)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다.
- 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담전화 080-597-1020 에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.
- 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.



[제조사]




충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로10

[제조외역자]



인천광역시 남동구 함박역로 316 17B-2L

[판매자]



경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109

개정년월일: 2019년 2월 11일