



해열·진통·소염제

아트라정 Atra Tab.

전문약품 분류번호:01140

- 성분·함량 1정 중 트라마돌염산염(KP)..... 37.5mg 아세트아미노펜(KP)..... 325.0mg...

12세 이상의 소아 및 성인 : 용량은 환자의 통증 정도 및 치료 반응에 따라 조절합니다. ... 부작용전지 - 중등도 신부전 환자(크레아티닌 청소율이 10~30ml/분)에게는 투여간격을 12시간으로 연장하여 투여하도록 합니다.

- 1. 경고 1) 트라마돌을 권장용량 범위 내에서 투여받은 환자에서 발작이 보고된 바 있으며, 권장용량 이상 투여시 발작의 위험은 증가되는 것으로 나타났습니다. ... 2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이 약의 성분과 과민성이 있는 환자

- 2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 1) 이 약의 성분과 과민성이 있는 환자 2) 알코올, 수면제, 중추자극성제, 마취제 또는 항경련성 약물 등 중추신경계 작용약물 중독 환자 ... 4. 이상반응 4.1 이상반응 1) 과민증 - 속 등의 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.

- 4.2 부작용 1) 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 37,967명의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 이상반응의 발현종류 ... 1) 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 37,967명의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 이상반응의 발현종류

- (1) 전신이상: 두력증, 피로, 발열, 무중, 흉통, 경직, 심신, 금단증상이 나타남. ... (10) 순환기계: 심계항진, 고혈압, 부정맥, 빈맥, 고혈압약, 대동맥협착

- (1) 기타: 하혈, 콜레스테롤수상, 체중감소, 이명, 오한, 열당미통증, 대퇴통증, 일례르기성비염, 비출혈, 비정성사야, 담도 ... 5. 일반적 주의 1) 권장용량을 초과하여 투여하지 않도록 하며, 다른 트라마돌 또는 아세트아미노펜 제제와 병용 투여하지 않도록 합니다.

- 11) 이 약과 워프린 유사약물을 병용할 경우에는 혈액응고시간 (INR) 증가 보고가 있으므로, 의학적으로 적절한 경우 ... 12) 한 연구에서 연부부인과 임신화절술로 일반 마취중 트라마돌을 사용할 때 수술중 마취가 약해지는 경우가 증가 ... 6. 약물상호작용 1) 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 항우울제 및 식욕감퇴제, 삼환계 항우울제 (TCAs), 다른 삼환계 항우울제 ... 5.12세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확보되어 있지 않음. ... 5.12세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확보되어 있지 않음.

■ 저장방법 · 사용기간 일백육십, 실온(1~30°C)보관, 제조일로부터 36개월 ■ 포장단위 자사주

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / http://www.koreaprime.co.kr

본 약품은 엄격한 품질관리하에 제조된 K.G.M.파악적연체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손의 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

