

쉽게 빠지고 손상된 모발엔



카필러스 캡슐

일반의약품

[제품명] 카필러스캡슐

[유효성분] 이 약 1캡슐 중

약용호모(별규) 100mg / 케라틴(별규) 20mg(총 아미노산으로서 히스티딘 1.22mg, 로아신4.91mg, 리신 4.1mg) / 티아민질산염(KP) 60mg / 판토텐산칼슘(KP) 60mg / L-시스틴(KP) 20mg / p-아미노벤조산(USP) 20mg

[첨가제(타르색소)] 적색40호, 청색1호, 황색203호, 황색5호

[기타 첨가제] 스테아르산마그네슘, 캡슐제, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

[성상] 연회색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색(연노랑)의 경질캡슐제

[효능·효과] 1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진

2. 탈모의 보조치료

[용법용량] 성인 - 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용합니다.

12세 이상 소아 - 1회 1캡슐을 1일 1~2회 식후에 복용합니다.

12세 미만은 복용하지 않습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람

2) 12세 미만 소아

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른 맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조

2) 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우

3) 정해진 용법·용량대로 3~4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의하십시오.

2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 마십시오.

3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있습니다.

4) 평균 치료 기간은 3~6개월입니다.

5. 저장상의 주의사항

1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 마십시오.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 차광기밀용기, 25°C이하 보관

[포장단위] 90캡슐, 180캡슐

[최신정보확인방법] 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인 할 수 있습니다.

· 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

· 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002(고객만족실)

[작성 연월일] 2017. 09. 29

[부작용 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원)

제조외주자

Ⓜ 동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1,2A,4A층)

제조사

㈜마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

CPLC-7J001