

에이스틴 정 / 에이스틴 정 20mg (에이트라스테라딘함수물)

전문약제 품목관리처

※ 약용품을 사용하시기 전에 첨부서류를 주의깊게 읽고, 약작용과 함께 보관하십시오.

[특성·성질]

에이스틴은 에스트라디올 활성 성분과 결합하는 효소인 17β-OH-3-ketoreductase (에이스틴 환원효소)를 저해하여 17β-OH-에스트라디올을 생성...

[표준 성분]

- 1. 활성 성분 1 정량 : 20mg
에이스틴 (에이트라스테라딘함수물) 10.95mg
에이트라스테라딘함수물 10mg
...
2.2 정량 : 20mg
에이트라스테라딘함수물 10.95mg
에이트라스테라딘함수물 10mg

[효과·작용]

- 1. 다량의 성상분자 함유에 따른 위장장애
2. 항염증 효과
3. 항염증 효과
4. 항염증 효과
5. 항염증 효과
6. 항염증 효과
7. 항염증 효과
8. 항염증 효과
9. 항염증 효과
10. 항염증 효과

[효과·작용]

- 1. 항염증 효과
2. 항염증 효과
3. 항염증 효과
4. 항염증 효과
5. 항염증 효과
6. 항염증 효과
7. 항염증 효과
8. 항염증 효과
9. 항염증 효과
10. 항염증 효과

[사용법·주의사항]

- 1. 금기
2. 주의
3. 주의
4. 주의
5. 주의
6. 주의
7. 주의
8. 주의
9. 주의
10. 주의

치킨이 이 약의 주요 성분인 에이스틴에 의해 영향을 받을 수 있는 것은 아니지만, 에이스틴은 에스트라디올에 대한 약효를 감소시킬 수 있으므로...

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

또한, 특정 약물인 에이스틴과의 약물 상호작용은 간헐적으로 발생할 수 있으며, 이러한 상호작용은 간헐적으로 발생할 수 있으며...

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

14. 시력: 시력이 이 약의 영향으로 악화될 수 있으므로 정기적으로 시력 검사를 받아야 하며, 시력이 악화되면 즉시 의사와 상담하십시오.

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

15. 시력: 시력이 이 약의 영향으로 악화될 수 있으므로 정기적으로 시력 검사를 받아야 하며, 시력이 악화되면 즉시 의사와 상담하십시오.

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신

- 1. 임신
2. 임신
3. 임신
4. 임신
5. 임신
6. 임신
7. 임신
8. 임신
9. 임신
10. 임신